

Gránulos Dispersables

Insecticida

Uso agrícola

Reg. Nal. No: 2856

Actualización: septiembre de 2020

 **BASF**

We create chemistry

I

Entigris® WG

Entigris® WG es un insecticida que actúa en el sistema nervioso central y periférico en dosis muy bajas. Insecticida sistémico, por contacto y acción estomacal. Agonista/antagonista del receptor nicotínico de acetilcolina y modulador del canal del sodio.

Entigris® WG tiene acción sistémica y de contacto sobre insectos chupadores y masticadores.

Entigris® SC actúa sobre un amplio espectro de plagas y protege ampliamente los cultivos permitiendo su desarrollo sano y productivo.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes activos:

Dinotefuran: 140 gramos por kilogramo de formulación a 20°C
(EZ)-(RS)-1-metil-2-nitro-3-(tetrahydro-3-furilmetil)guanidina

Alfacipermetrina: 220 gramos por kilogramo de formulación a 20°C
(S)-α-ciano-3-fenoxibencil (1R)-cis-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetil ciclopropanocarboxilato y (R)-α-ciano-3-fenoxibencil (1S)-cis-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetil ciclopropanocarboxilato

Ingredientes aditivos:

C.s.p 1 kg

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Gránulos Dispersables**Insecticida**

Uso agrícola

Reg. Nal. No: 2856

Actualización: septiembre de 2020

BASF

We create chemistry

RECOMENDACIONES DE USO:

| CULTIVO | PLAGA | DOSIS | P.C.* | P.R.** |
|--------------------------|---|-------------------|---------|---------|
| Arroz (Oryza sativa) | Chinche de espiga (<i>Oebalus insularis</i>) | 0.3 kg/ha | 21 días | 4 horas |
| Arroz (Oryza sativa) | Gusano Cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>) | 0.3 kg/ha | 21 días | 4 horas |
| Arroz (Oryza sativa) | Sogata (<i>Tagosodes orizicolus</i>) | 0.35 kg/ha | 21 días | 4 horas |
| Maíz (Zea mays) | Spodoptera (<i>Spodoptera frugiperda</i>) | 0.30 kg/ha | 40 días | 4 horas |
| Papa (Solanum tuberosum) | Polilla Guatemalteca (<i>Tecia solanivora</i>) | 0.45 – 0.60 kg/ha | 60 días | 4 horas |

P.C.: Periodo de Carencia

P.R.: Periodo de Reentrada.

*Los períodos de carencia indicados en esta etiqueta son para las condiciones locales, para fines de exportación el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda la aplicación de ENTIGRIS® WG con base en el monitoreo de plagas. Rotar con otros mecanismos de acción como estrategia de manejo antirresistencia.



COMPATIBILIDAD Y FITOTOXIIDAD:

Se recomienda realizar pruebas de fito-compatibilidad con ENTIGRIS® WG en mezcla con otros productos agroquímicos.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico – químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Mantenga el producto en su empaque original, con la etiqueta en buen estado, bien tapado, en lugar fresco y aireado, lejos de alimentos y forrajes, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS y animales domésticos, nunca en el mismo lugar donde se duerme, come o prepara alimentos. No permanezca en la nube de aspersión.

Evite el contacto con la piel y los ojos. No fume, coma o beba mientras manipula el producto. Al terminar, cámbiese de ropa y báñese con abundante agua y jabón, en especial las partes del cuerpo expuestas al producto. No arroje los sobrantes a ríos o acequias.



INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

EN CASO DE INGESTIÓN NO INDUZCA EL VOMITO, ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA.

En caso de intoxicación llamar a CISPROQUIM. Teléfonos 01 8000 916012 o (1) 2886012 en Bogotá D.C. Servicio las 24 horas.



MEDIDAS PARA LA PROYECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Altamente tóxico para abejas. Puede matar insectos polinizadores. No aplicar este producto en presencia o actividad de insectos polinizadores o en época de floración. Extremadamente tóxico para organismos acuáticos. No contamine fuentes de agua. Se deben respetar las franjas de seguridad mínimas de 10 metros para aplicación terrestre, distante de cuerpos o cursos de agua, carreteras, troncales, núcleos de población humana y animal, cultivos susceptibles de daño por contaminación o cualquier otra área que requiera protección. No aplicar cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto en el suelo. No aplicar cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre de la aspersión hacia zonas no objetivo como canales, aguas corrientes o lagos. En caso de escape o incidente, recoger el producto derramado con ayuda de pala y cepillo. Posteriormente, el material se debe transferir a contenedores para evitar una posible contaminación. Si se aplica agua para la limpieza, también se debe controlar su dispersión.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILICELO TRITURANDOLO O PERFORANDOLO Y DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN O EN LOS LUGARES AUTORIZADOS POR EL PROGRAMA CAMPO LIMPIO DE RECOLECCIÓN DE ENVASES.

Categoría toxicológica: II MODERADAMENTE PELIGROSO - DAÑO
BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.