

Gránulos Dispersables WG

Fungicida - Acaricida

Uso agrícola

Reg. Nal. ICA 2614

Actualización Registro: noviembre 2021

Actualización Documento: Marzo 2023

 **BASF**

We create chemistry

F

Kumulus[®] WG

Kumulus[®] WG es un acaricida y fungicida multisitio. Su formulación es en gránulos dispersables y esto permite una rápida disolución del producto.

Kumulus[®] WG actúa por contacto, con acción preventiva.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes activos:

Azufre 800 gramos por kilogramo de formulación a 20°C

Ingredientes aditivos:

c.s.p 1 Kg

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Gránulos Dispersables WG**Fungicida - Acaricida**

Uso agrícola

Reg. Nal. ICA 2614

Actualización Registro: noviembre 2021

Actualización Documento: Marzo 2023

BASF

We create chemistry

RECOMENDACIONES DE USO:

| CULTIVO | ENFERMEDAD | DOSIS | P.C.* | P.R. |
|--|--|-----------------|--------|---------|
| Cebolla bulbo, Cebolla larga, Cebollín, Cebollín chino, Puerro | Mildeo (<i>Peronospora</i> sp) | 1.0 – 2.0 kg/ha | 1 día | 4 horas |
| Maracuyá, Gulupa, Granadilla, Badea, Chulupa, Curuba | Arañita roja (<i>Tetranychus urticae</i> Koch (Acari: Tetranychidae)) | 1.0 – 2.0 kg/ha | 1 día | |
| Mango, Durazno, Ciruela, Sapote | Arañita roja (<i>Tetranychus urticae</i> Koch (Acari: Tetranychidae)) | 1.0 – 2.0 kg/ha | 1 día | |
| Papaya, Chirimoya, Anon, Guanábana | Arañita roja (<i>Tetranychus urticae</i> Koch (Acari: Tetranychidae)) | 1.0 – 2.0 kg/ha | 1 día | |
| Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>) | Alternaria (<i>Alternaria</i> sp) | 1.0 – 2.0 kg/ha | 1 día | |
| Rosa (<i>Rosa</i> spp.) | Oídio (<i>Podosphaera pannosa</i>) | 1.0 – 2.0 kg/ha | 1 día | |
| Aguacate | Arañita roja (<i>Tetranychus urticae</i> Koch (Acari: Tetranychidae)) | 1.0 – 2.0 kg/ha | 1 día | 4 horas |
| Naranja (<i>citrus sinensis</i>) | Acaro blanco (<i>Polyphagotarsonemus latus</i> Banks (Acari: tarsonemidae)) | 1.0 – 2.0 kg/ha | 1 día | |
| Naranja, Limón, Mandarina, Lima, Tangelo, Toronja | Antracnosis (<i>Colletotrichum</i> sp) | 1.0 – 2.0 kg/ha | 1 día | |
| Banano (<i>Musa</i> AAA Simmonds) | Arañita roja (<i>Tetranychus urticae</i> Koch (Acari: Tetranychidae)) | 1.5 – 2.0 kg/ha | 0 días | 4 horas |
| | Sigatoka Negra (<i>Pseudocercospora fijiensis</i>) | 3.0 kg/ha | | |

PR*: Periodo de reentrada, intervalo de tiempo entre la última aplicación y la entrada de personal al área tratada.

PC**: Periodo de carencia, intervalo de tiempo entre la última aplicación y la cosecha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Kumulus® WG se debe aplicar cuando las condiciones del ambiente sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Rotar con otros mecanismos de acción como estrategia de manejo antirresistencia.





COMPATIBILIDAD Y FITOTOXIIDAD:

Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad con Kumulus® WG en mezcla con otros productos agroquímicos.

Realizar prueba de fitotoxicidad en variedades susceptibles o al mezclar con otros productos previo a la aplicación del producto.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico – químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS Y USO

Este producto puede ser mortal si se ingiere.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo con el Periodo de Reentrada (Reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascarara y guantes. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Lave la ropa y elementos de protección aparte de la ropa de uso normal.

No permanezca en la nube de aspersión.



PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

EN CASO DE INGESTIÓN NO INDUZCA EL VOMITO, ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MAS CERCANA.

En caso de intoxicación llamar a CISPROQUIM. Teléfonos 01 8000 916012 o (1) 2886012 en Bogotá D.C. Servicio las 24 horas.

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Extremadamente tóxico para organismos acuáticos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.

Respete las franjas de seguridad de 10 metros en aplicaciones terrestres y 100 metros para aplicaciones aéreas, en relación con cuerpos o cursos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, o cualquiera otra área que requiera protección especial.

Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.

Nocivo para la fauna benéfica.

No aplicar cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto en el suelo.

No aplicar cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre de la aspersión hacia zonas no objetivo como canales, aguas corrientes o lagos.

En caso de derrame, recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.

NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO. DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILICELO TRITURANDOLO O PERFORANDOLO. ENTREGUE O DEPOSITE EL ENVASE EN EL LUGAR DE DESTINO DISPUESTO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE O EN LOS LUGARES AUTORIZADOS POR EL PROGRAMA CAMPO LIMPIO DE RECOLECCIÓN DE ENVASES.