

# Molirox®

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- **MOLIROX** pertenece al grupo químico de los tiocarbamatos. No use este producto si el médico le ha aconsejado no trabajar con estos compuestos.
- No comer, beber ni fumar durante la manipulación y aplicación del producto.
- Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco, exclusivo para productos fitosanitarios.
- Destine un equipo exclusivamente para aplicar herbicidas. Si esto no fuera posible, después de la aplicación lave bien el equipo antes de uso para productos a fines.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación usar guantes de goma, botas de goma, delantal y protección facial. Durante la aplicación usar guantes de goma, botas de goma, protección facial y overol que impida el contacto del producto con la ropa y cuerpo.
- Aleje a los animales domésticos y personas extrañas. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto.
- No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.
- Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo separadamente de la ropa doméstica.
- Lavarse prolijamente con agua y jabón antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.
- **PARA APLICACIONES AÉREAS, OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE.**

**Síntomas de intoxicación:** Sudoración, dolor de cabeza, taquicardia, debilidad general e hipotensión, náuseas, vómitos, diarreas, irritación de la piel y mucosas.

### Primeros Auxilios:

- **Contacto con los ojos:** Lávelos inmediatamente con agua corriente por 10 a 15 minutos manteniendo los párpados separados. Acudir al médico si la irritación persiste.
- **Contacto con la piel:** Lávela inmediatamente con agua y jabón. Quitarse y lavar la ropa contaminada. Acudir al médico si la irritación persiste.
- **Inhalación:** Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.
- **Ingestión:** No provocar el vómito. Llamar al médico inmediatamente.

**Tratamiento médico de emergencia:** Realizar tratamiento sintomático y de sostén. En caso de ingestión realizar lavado gástrico con cuidado para prevenir la aspiración de los contenidos gástricos.

**Antídoto:** No se conoce antídoto específico.

**Riesgos ambientales:** Molirox presenta bajo riesgo para la microflora del suelo y lombrices de tierra, y especies de aguas templadas. No es tóxico para abejas, prácticamente no tóxico para aves. Tóxico para peces y organismos acuáticos.

**“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS”. “EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD” “REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”. “NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”. “NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”. “NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO DE REINGRESO INDICADO DE REINGRESO”.**

### Teléfonos de emergencia:

BASF Chile S.A.: (2) 640 7000  
CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (2) 635 3800  
CITUC Químico (Emergencia química): (2) 247 3600

En caso de INTOXICACION  
llamar al:

**6353800**

SANTIAGO

**Atención las 24 horas**

CONVENIO CITUC/AFIPA

**Nota al comprador:** Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9.-10.-11.-12/2009 G.A.-M.E.S OCT 2009 - 1



ABRA AQUI - Instrucciones de Uso al Reverso



**FRANJA  
AMARILLA**

**NOCIVO**

# Molirox®

## INSTRUCCIONES DE USO

### GENERALIDADES

**Molirox**, herbicida selectivo para ser utilizado en siembras de arroz paddy. Actúa sobre la zona del cuello de las malezas, deteniendo su crecimiento y causando posteriormente su muerte. Controla todas las variedades de hualcacho, arroz rojo, otras gramíneas y ciperáceas provenientes de semillas, las cuales se nombran en el cuadro que se muestra a continuación.

### INSTRUCCIONES DE USO

Cultivo	Malezas	Dosis (L/ha)	Observaciones
Arroz	Hualcachos ( <i>Echinochloa colona</i> ) ( <i>Echinochloa cruz-galli</i> ) ( <i>Echinochloa cruz-pavonis</i> )	5,0	Tratamiento de pre-siembra incorporado. Al ser un herbicida volátil debe incorporarse inmediatamente después de la aplicación. Incorporar con rastra de disco o de clavo liviana a una profundidad no superior a 9 cm. Emplear solo equipos terrestres, evitando los traslajos y consecuentes sobredosis que puedan dañar al cultivo. Realizar una aplicación por temporada. Mojamiento para Aplicaciones Terrestres: 150 L/ha.
	Arroz rojo ( <i>Oryza sativa</i> ) Yerba lengüeta de flecha ( <i>Polypogon spp</i> ) Torurco y Paja-pichi ( <i>Paspalum spp</i> )	9,0 - 10,5	Tratamiento de pre-siembra incorporado. Al usar dosis mayores para el control de arroz rojo, no sembrar antes de 4 días después de aplicado el producto. Realizar una aplicación por temporada. Mojamiento para Aplicaciones Terrestres: 270 L/ha a 315 L/ha.
	Hualcachos ( <i>Echinochloa colona</i> ) ( <i>Echinochloa cruz-galli</i> ) ( <i>Echinochloa cruz-pavonis</i> ) Junquillo, Pasto de agua, Quilmen ( <i>Eleocharis spp</i> ) Sombrillita, Totora, Junco, Chufa ( <i>Scripus spp</i> )	5,5 - 6,0	Tratamiento de post-emergencia, post-inundación. Aplicar 10 a 15 días después de la siembra. Pulverizar por vía aérea (*) o manual después de inundar los cuarteles, aplicando directamente sobre la lamina de agua, de unos 5 a 10 cm, utilizando equipo pulverizador de espalda sin motor con barra tipo T con boquillas para herbicidas. El hualcacho debe tener 10 a 15 cm. de altura como máximo y estar sumergido por lo menos hasta las 2/3 partes de su tamaño al momento de aplicar. Se debe mantener el nivel del agua hasta que el hualcacho muera. Realizar una aplicación por temporada. Mojamiento para Aplicaciones Terrestres: 165 L/ha. La dosis mayor en las aplicaciones aéreas.

(\*) En aplicaciones aéreas utilizar 60 L agua/ha.

**Preparación de la mezcla:** Molirox se puede adicionar directamente al estanque a medio llenar de agua y completar al volumen requerido con agitación constante.

**Compatibilidad:** Molirox es compatible con herbicidas sulfonil úreas, ateniéndose a las restricciones de las etiquetas.

**Incompatibilidad:** No se conocen incompatibilidades específicas. En caso de mezclas diferentes a las indicadas, consultar a nuestro Departamento Técnico.

**Fitotoxicidad:** Molirox solo debe ser aplicado en arroz. Durante las aplicaciones evitar traslajo para no aplicar sobredosis que pueda dañar al cultivo.

**Período de carencia:** No aplicable por el momento de la aplicación del herbicida.

**Tiempo de reingreso:** No corresponde por las características del cultivo.



FRANJA  
AMARILLA

NOCIVO



The Chemical Company

# Molirox<sup>®</sup>

## Herbicida de presembr Concentrado emulsionable (EC)

Herbicida selectivo para control de hualcacho en todas sus variedades, otras gramíneas y ciperáceas provenientes de semillas de arroz, las cuales se indican en el cuadro de instrucciones de uso.

### Composición

\* Molinate .....747,7 g/L (74,77% p/v)  
Ingredientes inertes..... hasta completar 1 litro

\* S-etil hexahidro-1-H-azepin-1-carbotioato. Equivale a 72.6% p/p

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°: 3350

**INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO**

Lote:  
Vencimiento:

Contenido neto: **5 Litros**

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y FOLLETO ADJUNTO  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Fabricado por:  
**SIPCAM S.p.A.**  
Via Gian Galeazzo 3  
Milano-Italia

Importado y Distribuido por  
**BASF Chile S.A.**  
Carrascal 3851 - Casilla 3238  
Fono: (2) 6407000  
Santiago - Chile

© Marca Registrada de Sipcam S.p.A.



**NOCIVO**

**FRANJA  
AMARILLA**