

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: BOTAS, MASCARILLA, ANTEOJOS, GANTES, DOSIFICADOR Y EQUIPO DE APLICACIÓN.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DELE ESTE ETIQUETA O EL PANFLETO.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Ligera irritación en los ojos y piel. Otros síntomas posibles, irritación bronquial, excitación nerviosa y molestias gastrointestinales.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Si la persona está consciente, lavar inmediatamente la boca y dele a beber agua en abundancia. En República Dominicana dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado dele clara de huevo en un poquito de agua (8 para adultos y 4 para niños). Busque ayuda médica. NO inducir el vómito. Obtenga atención médica.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón por 15 minutos.

POR INHALACIÓN: Retire al paciente a un lugar fresco, seco y aireado; manténgalo en reposo y vigile la respiración.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Abra los párpados y lave los ojos con un flujo continuo de agua limpia durante 15 minutos. Consulte al médico.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: Tratamiento sintomático y de soporte.



(01)04014348527729



We create chemistry

Polyram® 70 WG

FUNGICIDA - TIOCARBAMATO
METIRAM

Composición química:

Zinc amoniate ethylenebis (dithiocarbamate)-poly (ethylenethiuram disulfide)	70,0%	p/p
Ingredientes inertes	30,0%	
Total	100,0%	

Contiene: 700 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.

25 kg

Contenido neto:

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

FORMULADOR:

BASF SE, BASF Societas Europaea, 67056 Ludwigshafen, Alemania.

© Marca registrada de BASF

CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS, ANTES DE COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

AVISO DE GARANTÍA: Las instrucciones para el uso de este producto reflejan los resultados de la experiencia de la compañía basada en ensayos de campo y uso práctico. Dichas instrucciones se creen dignas de confianza y deben observarse cuidadosamente. Es imposible, sin embargo, eliminar los riesgos inherentes al uso de este producto. Cualquier daño a la cosecha, falta de eficacia y otras consecuencias involuntarias, pueden ser el resultado de factores que están fuera del control de BASF, como condiciones climáticas, presencia de otros materiales, el método de uso o aplicación, etc. El usuario debe asumir dichos riesgos. BASF y el registrante sólo garantizan que el producto se ajusta a la descripción química de la etiqueta y que es razonablemente apto para los usos aquí descritos y en el panfleto, cuando se usa de acuerdo con las instrucciones y sujeto a los riesgos mencionados anteriormente. **BASF NO DA NI AUTORIZA A NINGÚN AGENTE O REPRESENTANTE PARA DAR NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA Y NO PRESTA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA CUALQUIER FIN DETERMINADO.**

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	78-35	22-11-12
EL SALVADOR	2711	02-02-15
COSTA RICA	2711	21-12-92
PANAMÁ	1075eg	22-09-09
REP. DOMINICANA	2768	27-07-11
HONDURAS	125-63-II	28-01-13
BELICE	0281-1	14-01-14

NÚMERO DE LOTE: ver etiqueta o ver envase

FECHA DE FORMULACIÓN: ver etiqueta o ver envase

FECHA DE VENCIMIENTO: ver etiqueta o ver envase

81118760CR1077

**¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.**

BASF
We create chemistry

Polyram® 70 WG

**FUNGICIDA – TIOCARBAMATO
METIRAM**

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL
SI SE INGIERE Y/O SE INHALA
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS
Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS,
PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,
ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS
Y MEDICAMENTOS**



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:

Polyram® 70 WG es un fungicida, protectante, que inhibe el proceso de germinación o desarrollo de los hongos.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Aspersora de mochila o equipo accionado por tractor. En banano, cítricos y plátano la aplicación puede realizarse con avioneta o helicóptero. Antes de utilizar el equipo de aspersión, revise cuidadosamente que esté en buen estado de funcionamiento. Antes de aplicar **Polyram® 70 WG**, calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que está aplicando la dosis correcta. Se recomienda usar boquillas de cono hueco. Para dosificar la cantidad correcta de acuerdo al tanque de la aspersora debe utilizar un tazón medidor.

Después de la aplicación lave el equipo de aspersión con agua y jabón, deje secarlo y guárdelo.

En Costa Rica, cuando la aplicación terrestre no sea posible para los cultivos de banano, plátano, arroz y cítricos, la aplicación aérea se acepta bajo el supuesto de que ocurran riesgos de deriva durante la aplicación. No aplicar con velocidades de viento superiores a las 5 millas por hora (8 km/h), ni cuando la temperatura exceda los 32° C o la humedad relativa sea inferior al 70%. Calibre el equipo antes de aplicar el producto. En aplicaciones aéreas el volumen de caldo no debe ser menos de 11 L/Ha para banano y plátano, 50 L/Ha para cítricos y 40 L/ha para arroz en aplicaciones terrestres use un mínimo de 55 L/Ha banano y plátano, 250 L/Ha para cítricos y 200 L/ha para arroz. Lave el equipo después de cada jornada de trabajo. Utilice boquillas de cono hueco.

En Costa Rica para aplicaciones aéreas acátese el Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola según Decreto N° 31520-MS-MAG-MINAE-MOPT-MGSP y Decreto N° 34202-MS-MAG-MOPT-MGSP o el reglamento vigente.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Póngase el equipo de protección personal, antes de usar y manipular **Polyram® 70 WG**. Como con todos los productos químicos **evite en lo posible el contacto con la solución**. No comer, beber o fumar durante el manejo y aplicación de este producto.

Preparación de Polyram® 70 WG en dispersión en agua:

1. De acuerdo con la dosis de **Polyram® 70 WG** a utilizar, mezclarlo en el tanque con agua limpia hasta la mitad;
 2. Completar el volumen de agua requerido;
 3. Agitar para obtener una mezcla homogénea antes de comenzar la aspersión.
- Se recomienda una presión de 20 a 40 libras por pulgada cuadrada y un volumen de 285-570 litros de agua por hectárea.

Polyram® 70 WG en el caso del cultivo de banano y plátano puede ser aplicado en agua, en una emulsión agua-aceite y en una emulsión-agua en mezcla con fungicidas sistémicos.

Preparación de Polyram® 70 WG en emulsión aceite-agua:

1. Verter la cantidad de aceite a aplicar (2-7 L/ha) e iniciar agitación.
2. Agregar el emulsificante (1% del volumen del aceite), y agitar mínimo durante 5 ó 10 minutos o hasta que se mezcle bien con el aceite.
3. Añadir el 50% del volumen de agua requerido, agitar mínimo por 5 minutos más.
4. Añadir la cantidad recomendada de **Polyram® 70 WG**. Mezclar bien durante 5 minutos.
5. Con el agitador en movimiento, añadir la cantidad restante del agua requerida, agitar mínimo por 5 minutos más.
6. El caldo está listo para la aplicación.



En el caso de mezclas con fungicidas sistémicos, preparar la emulsión siguiendo los pasos descritos anteriormente para la preparación de **Polyram® 70 WG** en emulsión aceite-agua.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVOS AUTORIZADOS EN COSTA RICA Y EL SALVADOR:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	INTERVALO DE APLICACIÓN	INTERVALO PRE-COSECHA
Banano y Plátano Musa sp.	Sigatoka negra Micosphaerella fijiensis	1.2-1.4 kg/ha	De 4 a 8 días dependiendo de la presión de la enfermedad. Realizar un máximo de 13 aplicaciones de este producto por año. Utilice preventivamente con una presión de la enfermedad baja, en cualquier etapa de desarrollo de la planta.	0

Tabaco Nicotiana tabacum	Moho azul Peronospora tabacina	1.5-3 kg/ha	Deberá aplicarse al observarse la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda hacer aspersiones con intervalos de 8 a 15 días o de acuerdo a la incidencia de la enfermedad.	7
Coliflor Brassica oleracea var. Botrytis	Mildiu Peronospora destructor	2.0-3.0 kg/ ha		7
Frijol Phaseolus vulgaris	Antracnosis Colletotrichum lindem- tianum Roya del frijol Uromyces appendicu- latus	1.5-2.0 kg/ ha		7
Papa Solanum tuberosum	Tizón tardío Phytophthora infestans Tizón temprano Alternaria solani Mancha gris Stemphylium spp	1.5-2.5 kg/ ha		7
Tomate Lycopersicon escu- lentum	Viruela Septoria spp. Abigarrado Cladosporium spp. Antracnosis Colletotrichum sp	1.5-2.5 kg/ ha		7
Melon Cucumis melo Sandía Citrullus vulgaris Pepino Cucumis sativus	Mildiu veloso Peronospora destructor Antracnosis Colletotrichum lagenarium Alternaria Alternaria cucumerina	1.5-2.0 kg/ ha		7
Manzana Malus spp	Roña Venturia inaequalis	3.0 kg/ha		7
CULTIVO	PLAGA	DOSIS		INTERVALO DE APLICACIÓN

Cítricos <i>Citrus spp.</i>	Verruga <i>Elsine sp.</i> Melanosis Diaporthe citri Gomosis <i>Phytophthora sp.</i>	2.0-3.0 kg/ ha	Deberá aplicarse al observarse la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda hacer aspersiones con intervalos de 8 a 15 días o de acuerdo a la incidencia de la enfermedad.	7
Cebolla <i>Allium cepa</i>	Antracnosis <i>Colletotrichum sp.</i> Mildiu veloso <i>Peronospora destructor</i>	1.5-2.0 kg/ ha		7
Uvas <i>Vitis vinifera</i>	Mildiu <i>Plasmospora sp.</i> Podredumbre negra <i>Guarnardia sp.</i>	2.0-3.0 kg/ ha		7
Flores y Ornamentales	Pudre negra <i>Phytophthora sp.</i> Roya <i>Uromyces sp.</i> Alternaria <i>Alternaria sp.</i> Septoria <i>Septoria sp.</i> Roya <i>Puccinia sp.</i>	3.0 kg/ha		7
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Mancha marrón <i>Helminthosporium oryzae</i>	1 -1.4 kg/ha		7

CULTIVOS AUTORIZADOS EN GUATEMALA, HONDURAS Y PANAMÁ:

Manzana	Malus spp
Pera	Pyrus communis
Tabaco	Nicotiana tabacum
Tomate	Lycopersicon esculentum
Melón	Cucumis melo
Pepino	Cucumis sativus
Sandía	Citrullus vulgaris
Frijol	Phaseolus vulgaris
Papa	Solanum tuberosum
Cebolla	Allium cepa
Apio	Apium graveolens
Algodón	Gossypium spp
Maní	Arachis hypogaea
Maíz	Zea mays
Cacao	Theobroma cacao
Cítricos	Citrus spp
Coliflor	Brassica oleracea var. botrytis
Repollo	Brassica oleracea var. capitata
Zanahoria	Daucus carota
Espárrago	Asparagus officinalis
Ornamentales.	

CULTIVOS AUTORIZADOS EN REPÚBLICA DOMINICANA:

Papa	Solanum tuberosum
------	--------------------------

Ajo	Allium sativum
Cebolla	Allium cepa
Tomate	Lycopersicon esculentum
Arroz	Oryza sativa
Tabaco	Nicotiana tabacum
Frijol	Phaseolus vulgaris
Pepino	Cucumis sativus
Melón	Cucumis melo

CULTIVOS AUTORIZADOS EN PANAMÁ:

Cucurbitáceas:	
Pepino	Cucumis sativus
Melón	Cucumis melo
Sandía	Citrullus vulgaris
Calabaza, ayote, zapallo	Cucurbita máxima
Ayote	Cucurbita mixta
Ayote	Cucurbita ficifolia
Ayote	Cucurbita moschata
Cundeamor	Momordica Charantia
Pumpkins, zuquini	Cucurbita pepo
Chayote	Sechium edule

CULTIVOS AUTORIZADOS EN GUATEMALA, HONDURAS, REPÚBLICA DOMINICANA, PANAMA:

Banano y plátano	Musa sp
------------------	----------------

En **banano y plátano** utilice preventivamente con una presión de la enfermedad baja, en cualquier etapa de desarrollo de la planta.

PLAGAS A CONTROLAR EN GENERAL:

Tizón tardío	Phytophthora spp
Tizón temprano	Alternaria spp
Mancha gris	Stemphylium spp
Viruela	Septoria spp
Antracnosis spp	Colletotrichum spp
Moho azul	Peronospora tabacina
Mal del talluelo	Fusarium spp, Rhizoctonia spp, Pythium spp
Mancha foliar	Mycosphaerella berkeleyi
Roya	Uromyces spp
Antracnosis	Colletotrichum spp
Niebla de maíz	Helminthosporium spp
Pudrición negra del fruto	Phytophthora parasitica
Verrugosis	Elsinoe spp
Melanosis	Diaporthe spp
Gomosis	Phytophthora spp
Antracnosis	Gloesporium spp
Roña	Venturia spp
Podredumbre negra	Botryosphaeria obtusa
Mildiu	Peronospora destructor
Mancha anular	Mycosphaerella brassicola
Mildiu	Peronospora parasitica
Roya	Puccinia spp
Manchas negras	Diplocarpun spp
Mancha foliar	Septoria spp
Quemaito	Alternaria porri

Piricularia
Helminthosporium
Cercospora
Escaldado de la hoja
Mildiu
Sigatoka negra

Pyricularia oryzae
Helminthosporium oryzae
Cercospora oryzae
Rhynchosporium oryzae
Pseudoperonospora cubensis
Mycosphaerella fijiensis



DOSIS RECOMENDADAS:

Hortalizas, frijol, tabaco, cacao: 2-3 kg/ha
Cítricos, rosa, clavel, hortencia: 100 a 300 gramos por 100 litros de agua. Por bomba de mochila aplique 6 a 8 medidas de 25 cm³ (1 medida 25 cm³ de **Polyram® 70 WG** = 16 gramos).
Banano y plátano: 1.2-1.4 kg/ha. Realizar un máximo de 13 aplicaciones de **Polyram® 70 WG** por año.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Hortalizas, cucurbitas, frijol, tabaco, cacao, cítricos, rosa, clavel, hortencia: Deberá aplicarse al observarse la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda hacer aspersiones con intervalos de 8 a 15 días o de acuerdo a la incidencia de la enfermedad.
Banano y plátano: 4-8 días, dependiendo de la presión de la enfermedad.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Hortalizas, cucurbitas, frijol, tabaco, cacao, cítricos, rosa, clavel, hortencia: Siete días, cuando se usa solo el producto.
Banano y plátano: 0 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Después que la mezcla de producto se haya secado en el follaje del cultivo tratado.

FITOTOXICIDAD:

Polyram 70 WG no es fitotóxico a cultivos mencionados si se aplica según nuestras recomendaciones. Lea las etiquetas de todos los productos usados en la mezcla.

COMPATIBILIDAD:

Polyram® 70 WG es compatible con la mayoría de fungicidas, insecticidas y acaricidas. La mezcla con Diazinon y Malation, deben ser pulverizadas inmediatamente. El **Polyram® 70 WG** no puede ser mezclado con caldos a base de aceite más Parathion. En banano y plátano puede utilizarse en mezcla con Calixin® 86 OL, Volley® 88 OL, Opus® 12,5 SC, Cumora® 50 SC, Regnum® 25 EC en aplicaciones en emulsión con aceite. Verifique compatibilidad con otros productos antes de usarlo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No es inflamable ni corrosivo. No almacene ni transporte **Polyram® 70 WG** junto con alimentos de consumo humano, animal, fertilizantes, herbicidas y semillas. Almacénese y transportese en su envase original, en un lugar seco y bien ventilado, lejos del alcance de los niños o personas mentalmente incapacitadas. Manéjese con cuidado para evitar derrames; si esto sucede, cúbralos con aserrín o tierra y luego recoja en un envase con tapa; deseche según la legislación nacional.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Ligera irritación en los ojos y piel. Otros síntomas posibles, irritación bronquial, excitación nerviosa y molestias gastrointestinales.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Si la persona está consciente, lavar inmediatamente la boca y dele a beber agua en abundancia. En **República Dominicana** dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado déle clara de huevo en un poquito de agua (8 para adultos y 4 para niños). Busque ayuda médica. NO inducir el vómito. Obtenga atención médica.

POR INHALACIÓN: Retire al paciente a un lugar fresco, seco y aireado; manténgalo en reposo y vigile la respiración.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Abra los párpados y lave los ojos con un flujo continuo de agua limpia por 15 minutos. Consulte al médico.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón por 15 minutos.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico, tratamiento sintomático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN

Guatemala: Centro de Información Toxicológica	2251-3560 y 2232-0735
El Salvador: Hospital San Rafael, Santa Tecla	2288-0417
Honduras: Hospital Escuela	2232-2415 y 2232-2322
Costa Rica: Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones	2223-1028/911
Panamá: Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	523-4948
República Dominicana: Hosp. Dr. Luis Aybar Hosp. Dr. Francisco Moscoso Puello	681-2181 681-7828

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO A PECES Y CRUSTÁCEOS.

**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES
CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua

limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. A fin de evitar remanentes se sugiere preparar la mezcla a utilizar en el día.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

Las instrucciones para el uso de este producto reflejan los resultados de la experiencia de la compañía basada en ensayos de campo y uso práctico. Dichas instrucciones se creen dignas de confianza y deben observarse cuidadosamente. Es imposible, sin embargo, eliminar los riesgos inherentes al uso de este producto. Cualquier daño a la cosecha, falta de eficacia y otras consecuencias involuntarias, pueden ser el resultado de factores que están fuera del control de BASF, como condiciones climáticas, presencia de otros materiales, el método de uso o aplicación, etc. El usuario debe asumir dichos riesgos. BASF y el registrante sólo garantizan que el producto se ajusta a la descripción química de la etiqueta y que es razonablemente apto para los usos descritos en el panfleto, cuando se usa de acuerdo con las instrucciones y sujeto a los riesgos mencionados anteriormente. **BASF NO DA NI AUTORIZA A NINGÚN AGENTE O REPRESENTANTE PARA DAR NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA Y NO PRESTA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA CUALQUIER FIN DETERMINADO.** *Los períodos de carencia indicados en el panfleto son para las condiciones locales, para fines de exportación el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino.*

FORMULADO POR:
BASF SE, BASF Societas Europaea,
67056 Ludwigshafen, Alemania.
Tel: 0621 60 93475
Fax: 0621 60 27123

IMPORTADO POR:

GUATEMALA:
BASF DE GUATEMALA S.A.
Av. Petapa 47-31 Zona 12
Ciudad de Guatemala.
Tel: 2445-7600, Fax: 2445-7699

EL SALVADOR:
Agroquímica Internacional (AGRINTER).
Km 31 Carretera a San Juan Opico Sitio El Niño, La Libertad, El Salvador.
Distribuidores e Importadores Agrícolas (DIAGRI S.A DE CV).
6a Calle Ote. N° 24, Rosario la Paz Depto. La Paz, El Salvador C.A.
Técnica Universal Salvadoreña, S.A. de CV.
Km 9 ½ Carretera al Puerto de la Libertad, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador.

COSTA RICA:
BASF DE COSTA RICA S.A.
Edificio Los Balcones
Plaza Roble, Escazú
San José, Costa Rica
Tel: (506) 2201 1900
Fax: (506) 2201 8221

REPÚBLICA DOMINICANA:
BASF DOMINICANA S.A.
Av. Gustavo Mejía Ricart No. 11
Edificio Rogama, Tercer Nivel
Santo Domingo - República Dominicana
Tel: 334-1026, Fax: 334-1027

DISTRIBUIDO POR:

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	78-35	22-11-12
EL SALVADOR	2711	02-02-15
NICARAGUA		
COSTA RICA	2711	21-12-92
PANAMÁ	1075eg	22-09-09
REP. DOM.	2768	27-07-11
HONDURAS	125-63-II	28-01-13
BELICE	0281-1	14-01-14

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: BOTAS, MASCARILLA, ANTEOJOS, GUANTES, DOSIFICADOR Y EQUIPO DE APLICACIÓN.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DELE ESTE ETIQUETA O EL PANFLETO.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Ligera irritación en los ojos y piel. Otros síntomas posibles, irritación bronquial, excitación nerviosa y molestias gastrointestinales.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Si la persona está consciente, lavar inmediatamente la boca y dele a beber agua en abundancia. En *República Dominicana* dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado dele clara de huevo en un poquito de agua (8 para adultos y 4 para niños). Busque ayuda médica. NO inducir el vómito. Obtenga atención médica.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón por 15 minutos.

POR INHALACIÓN: Retire al paciente a un lugar fresco, seco y aireado; manténgalo en reposo y vigile la respiración.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Abra los párpados y lave los ojos con un flujo continuo de agua limpia durante 15 minutos. Consulte al médico.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: Tratamiento sintomático y de soporte.



(01)04014348527729



We create chemistry

Polyram® 70 WG

FUNGICIDA - TIOCARBAMATO METIRAM

Composición química:

Zinc amoniate ethylenebis (dithiocarbamate)-poly (ethylenethiuram disulfide)	70,0%
Ingredientes inertes	30,0%
Total	100,0%

Contiene: 700 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.

25 kg

Contenido neto:

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

FORMULADOR:

BASF SE, BASF Societas Europaea, 67056 Ludwigshafen, Alemania.

© Marca registrada de BASF

CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS, ANTES DE COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

AVISO DE GARANTÍA: Las instrucciones para el uso de este producto reflejan los resultados de la experiencia de la compañía basada en ensayos de campo y uso práctico. Dichas instrucciones se creen dignas de confianza y deben observarse cuidadosamente. Es imposible, sin embargo, eliminar los riesgos inherentes al uso de este producto. Cualquier daño a la cosecha, falta de eficacia y otras consecuencias involuntarias, pueden ser el resultado de factores que están fuera del control de BASF, como condiciones climáticas, presencia de otros materiales, el método de uso o aplicación, etc. El usuario debe asumir dichos riesgos. BASF y el registrante sólo garantizan que el producto se ajusta a la descripción química de la etiqueta y que es razonablemente apto para los usos aquí descritos y en el panfleto, cuando se usa de acuerdo con las instrucciones y sujeto a los riesgos mencionados anteriormente. **BASF NO DA NI AUTORIZA A NINGÚN AGENTE O REPRESENTANTE PARA DAR NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA Y NO PRESTA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA CUALQUIER FIN DETERMINADO.**

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	78-35	22-11-12
EL SALVADOR	2711	02-02-15
COSTA RICA	2711	21-12-92
PANAMÁ	1075eg	22-09-09
REP. DOMINICANA	2768	27-07-11
HONDURAS	125-63-II	28-01-13
BELICE	0281-1	14-01-14

NÚMERO DE LOTE: ver etiqueta o ver envase

FECHA DE FORMULACIÓN: ver etiqueta o ver envase

FECHA DE VENCIMIENTO: ver etiqueta o ver envase

81118760CR1077

NÚMERO DE LOTE:
FECHA DE FORMULACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: