

Suspensión concentrada SC
Insecticida
Uso agrícola
Reg. Nal. ICA 0288
Actualización: 09 de octubre de 2018


We create chemistry

I

Verismo® SC

Verismo® SC (Metaflumizone 240 g/L) es un insecticida con nueva química de última generación, pertenece a una nueva generación de insecticidas (Grupo 22: Bloqueadores del canal de sodio dependiente del voltaje), con efecto sobre lepidópteros y coleópteros y bajo impacto sobre la fauna benéfica. VERISMO® SC es prácticamente no tóxico para polinizadores (*Apis mellifera*).

Verismo® SC actúa por ingestión y contacto, bloquea los canales de sodio en el sistema nervioso central causando parálisis del insecto. No tiene resistencia cruzada con piretroides, ideal en cultivos donde se han realizado muchas aplicaciones con piretroides.

Verismo® SC por ser un insecticida de química nueva por tanto tampoco presenta resistencia cruzada con otros insecticidas.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes activos:

Metaflumizone 240 g/L
(EZ)-2'-[2-(4-cyanophenyl)-1-(α,α,α -trifluoro-m-tolyl)ethylidene]-4-(trifluoromethoxy) carbanilohidrazide de formulación a 20° C.

Ingredientes aditivos:

C.s.p. 1/L

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Suspensión concentrada SC
Insecticida
Uso agrícola
Reg. Nal. ICA 0288
Actualización: 09 de octubre de 2018

BASF
We create chemistry

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	Enfermedad/Plaga	Dosis producto comercial	PC*	PR**
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i> L.)	Cogollero (Tuta absoluta Myerick)	1 a 1.35 L/Ha	3	12
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Gusano Blanco (<i>Premnotypes vorax</i>)	0,5/200 L***	3	12
Repollo (<i>Brassica oleraceae</i>)	Polilla Dorso de diamante (<i>Plutella xylostella</i>)	1.2 L/Ha	3	12
Palma de aceite (<i>Elaeis guineensis</i> Jacq)	Defoliador (<i>Stenoma cecropia</i> Meyrick)	1 L/Ha	3	12

*P.C.: Periodo de carencia (días).

**P.R.: Periodo de reentrada (horas).

*** Volumen de la mezcla: 400-1000 litros de agua por hectárea.

Tomate y repollo:

Verismo® SC se debe aplicar en mezcla con un volumen de agua suficiente para cubrir uniformemente las plantas aplicadas.

Papa:

Aplicar Verismo® SC dirigido al tercio inferior de la planta (drench) usando una boquilla tipo cono cuya descarga origine la dosis recomendada.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Tomate y repollo: Aplique VERISMO® SC cada siete días, al observar las primeras larvas del insecto en los cogollos de las plantas. Efectúe máximo dos aplicaciones consecutivas y rote con otros mecanismos de acción.

Papa: Pueden realizarse tres aplicaciones de VERISMO® SC: En la siembra, en la desyerba y otra en el aporque.

Aplique VERISMO® SC (2.0 L/Ha.) al momento de la siembra para mantener su cultivo libre de plaga desde el inicio.





COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Se recomienda realizar pruebas de fitocompatibilidad antes de mezclar con otros productos.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:

El tanque del equipo se debe llenar hasta la mitad con agua, agregar el insecticida agitando continuamente. Luego, para mejores resultados adicione Break Thru® SL y complete el volumen de agua. Continúe agitando hasta homogenizar la mezcla. Realice el triple lavado del envase y agréguelo a la mezcla. Aplicar inmediatamente después de preparado.

PRESENTACIÓN: 250 cc, 400 cc, 500 cc, 1 L Y 5 L.

PRECAUCIONES:

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y bien cerrado, en un lugar fresco y aireado, lejos de alimentos, drogas, forrajes, animales domésticos y nunca en el mismo lugar donde se duerme, come o preparan los alimentos.

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión.
- Evite contacto con la piel y la ropa.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.



PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela esta etiqueta.

Por ingestión: NO PROVOCAR el vómito.

Por inhalación: retire al paciente a un lugar fresco, seco y aireado; manténgalo en reposo y vigile la respiración.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

No dar de beber nada, ni inducir el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.

En caso de intoxicación llamar a CISPROQUIM. Teléfonos 01 8000 916012 o (1) 2886012 en Bogotá D.C. Servicio las 24 horas. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimento o agua para consumo. Rotulado Aprobado ICA: 06/09/2007.



PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

No contamine fuentes de agua, ríos o acequias con el producto. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue el envase al programa Campo Limpio de manejo de envases

