

BASF

We create chemistry

HiStick® Plus ST

Inoculante líquido para soja

Composición

Bacterias fijadoras de nitrógeno (*Bradyrhizobium japonicum*)
Cepa E 109. Este producto suministra 5×10^9 bacterias viables a la elaboración y no menos de 1×10^8 bacterias viables al vencimiento (equivalente a 80.000 bacterias viables por semilla de soja)

N° Reg. SENAVE: 20045196

N° Libre venta: 20045101

**LEA ÍNTEGRAMENTE ESTE RÓTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

FORMULADOR:

BASF Argentina S.A.
Tel: 4317-9600 (CA1049AAA)
Tucumán 1 - Buenos Aires
Argentina

REGISTRADO E IMPORTADO POR:

BASF Paraguaya S.A. - Reg. SENAVE N° 30
Avda. Sta. Teresa. Edif. "Torres del Paseo" T II. P11.Of. 6
Tel: 021220790/ 021695641-3
Asunción - Paraguay
Representante en Paraguay de BASF SE,
67056 Ludwigshafen - Alemania

CONTENIDO NETO

2 litros

ORIGEN

Argentina

LOTE

Ver impreso en la vejiga

FECHA DE ELABORACIÓN

Ver impreso en la vejiga

FECHA DE VENCIMIENTO

12 meses a partir de la
fecha de elaboración

Características generales: HiStick®PlusST es un inoculante líquido de calidad superior con una alta concentración de bacterias fijadoras de nitrógeno, que suministran a las plantas el nitrógeno necesario para su desarrollo y óptima producción del cultivo de soja.

Dosis: esta vejiga de 2 Ltrs provee suficiente producto para tratar 1.000 kg de semilla de soja siguiendo las recomendaciones de la etiqueta. Este producto, debe ser conjuntamente utilizado con el protector Extension®, mezclar 1 vejiga de HiStick®PlusST (2Ltrs) con 1 vejiga de Extension® (690cc), este caldo es suficiente para tratar 1.000 kg de semillas de soja. En caso de necesitar mayor dilucion del caldo, utilizar agua limpia libre de cloro.

Instrucciones de uso: Tambor: agite antes de usar. Aplique directamente la dosis recomendada sobre la semilla y mezcle bien. Realice la inoculación en un momento próximo a la siembra (las semillas deben sembrarse dentro de las 24 horas posteriores al tratamiento). Máquina: Agite antes de usar. Coloque la dosis recomendada de HiStick®PlusST directamente en el recipiente específico para el inoculado líquido. Regule la máquina para aplicar la dosis recomendada. Mezclar suavemente hasta homogeneizar la cobertura sobre las semillas. Si las semillas van a ser tratadas con insecticidas, fungicidas o micronutrientes, dicho tratamiento debe ser previo a la inoculación.

Almacenamiento: HiStick®PlusST contiene microorganismos vivos en un medio estéril, por lo que es necesario evitar su exposición al sol y a temperaturas elevadas. Almacenar en envases originales en lugar fresco, seco y con temperaturas entre 4 y 25°C.