

Inoculante líquido para soja

Histick® Plus ST

Inoculante

Composición

Bacterias fijadoras de nitrógeno (*Bradyrhizobium japonicum*) Cepa E 109. Este producto suministra 5×10^9 bacterias viables a la elaboración y no menos de 1×10^8 bacterias viables al vencimiento (equivalente a 80.000 bacterias viables por semilla de soja)

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTE RÓTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Nº Reg. SENAVE: 20045196

Nº Libre venta: 20045101

Formulador: BASF Argentina S.A.
Tel: 4317-9600 (CA1049AAA)
Tucumán 1 - Buenos Aires
Argentina

Registrante: BASF Paraguay S.A.
Nº registro SENAVE:30
Tel: 021 220790
Dir: Estado Unidos 415 P5
Asuncion - Parguay

CONTENIDO NETO

2 litros

ORIGEN
Argentina

LOTE

Ver impreso en la vejiga

FECHA DE ELABORACIÓN

Ver impreso en la vejiga

FECHA DE VENCIMIENTO

Ver impreso en la vejiga

Características generales: Histick®PlusST es un inoculante líquido de calidad superior con una alta concentración de bacterias fijadoras de nitrógeno, que suministran a las plantas el nitrógeno necesario para su desarrollo y óptima producción del cultivo de soja.

Dosis: 200 ml / 100 kg de semilla de soja.

Instrucciones de uso: Tambor: agite antes de usar. Aplique directamente la dosis recomendada sobre la semilla y mezcle bien. Realice la inoculación en un momento próximo a la siembra (las semillas deben sembrarse dentro de las 24 horas posteriores al tratamiento). Si las semillas van a ser tratadas con insecticidas, fungicidas o micronutrientes, dicho tratamiento debe ser previo a la inoculación. Máquina: Agite antes de usar. Coloque la dosis recomendada de Histick®PlusST directamente en el recipiente específico para el inoculado líquido. Regule la máquina para aplicar la dosis recomendada. Sembradora: Agite antes de usar. El producto puede aplicarse a las semillas en la tolva de la sembradora, cuidando de cubrir uniformemente las semillas.

Se recomienda la mezcla con Extensión®.

En un recipiente limpio mezclar el Extensión® con el inoculante de Histick® Plus ST, según dosis recomendada. Mezclar suavemente por 10 minutos hasta homogenizar la mezcla.

Almacenamiento: Histick®PlusST contiene microorganismos vivos en un medio estéril, por lo que es necesario evitar su exposición al sol y a temperaturas elevadas. Almacenar en envases originales en lugar fresco, seco y con temperaturas inferiores a 25 °C.

Inoculante líquido para soja

Histick® Plus ST

Inoculante

Composición

Bacterias fijadoras de nitrógeno (*Bradyrhizobium japonicum*) Cepa E 109. Este producto suministra 5×10^9 bacterias viables a la elaboración y no menos de 1×10^8 bacterias viables al vencimiento (equivalente a 80.000 bacterias viables por semilla de soja)

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTE RÓTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Nº Reg. SENAVE: 20045196

Nº Libre venta: 20045101

Formulador: BASF Argentina S.A.
Tel: 4317-9600 (CA1049AAA)
Tucumán 1 - Buenos Aires
Argentina

Registrante: BASF Paraguay S.A.
Nº registro SENAVE:30
Tel: 021 220790
Dir: Estado Unidos 415 P5
Asuncion - Parguay

CONTENIDO NETO

2 litros

ORIGEN
Argentina

Importado y distribuido por:

Ver en etiqueta del pack

Precauciones

- No exponer al sol.
- Antes de usar, verificar la fecha de vencimiento.
- Conservar en lugar fresco.
- No dejar semilla inoculada expuesta a la luz solar, vientos o altas temperaturas.
- Mantenga el envase cerrado hasta su uso.

NOTA

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones de uso, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa o consecuencia del uso o almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad del producto dentro de la fecha de vencimiento.

 **BASF**
We create chemistry

© Marca registrada de BASF

 **BASF**
We create chemistry

LADO A

 **BASF**
We create chemistry

Inoculante líquido para soja

Histick® Plus ST

Inoculante

CONTENIDO NETO
4 x 2 litros

ORIGEN
Argentina

® Marca registrada de BASF

LOTE
Ver impreso en la vejiga
FECHA DE ELABORACIÓN
Ver impreso en la vejiga
FECHA DE VENCIMIENTO
12 meses de la fecha de elaboración

Inoculante líquido para soja

Histick® Plus ST

Inoculante

Composición

Bacterias fijadoras de nitrógeno (*Bradyrhizobium japonicum*) Cepa E 109. Este producto suministra 5×10^9 bacterias viables a la elaboración y no menos de 1×10^8 bacterias viables al vencimiento (equivalente a 80.000 bacterias viables por semilla de soja)

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTE RÓTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Esta caja tiene producto para tratar 4.000 kilos de semillas

Formulador: BASF Argentina S.A.
Tel: 4317-9600 (CA1049AAA)
Tucumán 1 - Buenos Aires
Argentina

Registrante: BASF Paraguaya S.A.
N° Reg SENAVE: 30
Tel.: 021 220 790
Dir.: Estados Unidos 415 P5
Asuncion - Paraguay

Representante en la Republica del Paraguay
de BASF SE 67056 Ludwigshafen - Alemania

 **BASF**
We create chemistry

Inoculante líquido para soja

Histick® Plus ST

Inoculante

Importado y distribuido por:

CONTENIDO NETO
4 x 2 litros

ORIGEN
Argentina

® Marca registrada de BASF

Inoculante líquido para soja

Histick® Plus ST

Inoculante

Características generales: Histick® Plus ST es un inoculante líquido de calidad superior con una alta concentración de bacterias fijadoras de nitrógeno, que suministran a las plantas el nitrógeno necesario para su desarrollo y óptima producción del cultivo de soja.

Instrucciones de uso: Tambor: agite antes de usar. Aplique directamente la dosis recomendada sobre la semilla y mezcle bien. Realice la inoculación en un momento próximo a la siembra (las semillas deben sembrarse dentro de las 24 horas posteriores al tratamiento). Si las semillas van a ser tratadas con insecticidas, fungicidas o micronutrientes, dicho tratamiento debe ser previo a la inoculación. Máquina: agite antes de usar. Coloque la dosis recomendada de Histick® Plus ST directamente en el recipiente específico para el inoculado líquido. Regule la máquina para aplicar la dosis recomendada. Sembradora: agite antes de usar. El producto puede aplicarse a las semillas en la tolva de la sembradora, cuidando de cubrir uniformemente las semillas. Se recomienda la mezcla con Extensión®, según dosis recomendada.

Almacenamiento: Histick® Plus ST contiene microorganismos vivos en un medio estéril, por lo que es necesario evitar su exposición al sol y a temperaturas elevadas. Almacenar en envases originales en lugar fresco, seco y con temperaturas inferiores a 25 °C.

Precauciones

- No exponer al sol.
- Antes de usar, verificar la fecha de vencimiento.
- Conservar en lugar fresco.
- No dejar semilla inoculada expuesta a la luz solar, vientos o altas temperaturas.
- Mantenga el envase cerrado hasta su uso.

NOTA

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones de uso, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa o consecuencia del uso o almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad del producto dentro de la fecha de vencimiento.