

|                                    |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>CATEGORÍA</b>                   | Herbicida                                            |
| <b>INGREDIENTE ACTIVO</b>          | Topramezone                                          |
| <b>GRUPO QUÍMICO</b>               | Benzoilpirazol                                       |
| <b>CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN</b> | 336 g/L<br>SC (Suspensión Concentrada)               |
| <b>MODO DE ACCIÓN</b>              | Sistémico                                            |
| <b>CÓDIGO HRAC</b>                 | F2 (Benzoilpirazol)                                  |
| <b>VALOR DEL pH</b>                | Aprox. 2.5 – 4.5                                     |
| <b>FABRICANTE / FORMULADOR</b>     | IPT Pergande GmbH                                    |
| <b>TOXICIDAD</b>                   | Ligeramente Peligroso. Banda de color AZUL           |
| <b>ANTÍDOTO</b>                    | No hay antídoto específico. Tratamiento sintomático. |
| <b>N° REGISTRO SENASA</b>          | PQUA N° 1571-SENASA                                  |

## MECANISMO DE ACCIÓN

**Convey®SC** es un herbicida sistémico que debe ser usado en post-emergencia temprana de malezas gramíneas y de hoja ancha en el cultivo de maíz.

**Convey®SC** es absorbido por el follaje de las plantas, se mueve a través del floema hacia los puntos de crecimiento y albinismo de las hojas. La muerte de las plantas ocurre entre los 15-20 días después de la aplicación.

## RECOMENDACIONES DE USO

| Cultivo | Problema      |                                | Dosis | P.C.<br>(días) | L.M.R<br>(ppm) |
|---------|---------------|--------------------------------|-------|----------------|----------------|
|         | Nombre común  | Nombre científico              | mL/Ha |                |                |
| Maíz    | Yuyo          | <i>Amaranthus hybridus</i>     | 70    | 45             | 0.01           |
|         | Yuyo          | <i>Amaranthus viridis</i>      |       |                |                |
|         | Amor seco     | <i>Bidens pilosa</i>           |       |                |                |
|         | Boerhavia     | <i>Boerhavia caribaea</i>      |       |                |                |
|         | Boerhavia     | <i>Boerhavia erecta</i>        |       |                |                |
|         | Pajilla       | <i>Chloris halophylla</i>      |       |                |                |
|         | Coquito       | <i>Cyperus rotundus</i>        |       |                |                |
|         | Eclipta       | <i>Eclipta alba</i>            |       |                |                |
|         | Lechera       | <i>Euphorbia hypericifolia</i> |       |                |                |
|         | Capulí        | <i>Physalis peruviana</i>      |       |                |                |
|         | Verdolaga     | <i>Portulaca oleracea</i>      |       |                |                |
|         | Rabo de zorro | <i>Setaria geniculata</i>      |       |                |                |
|         | Pega pega     | <i>Setaria verticillata</i>    |       |                |                |
|         | Pichana       | <i>Sidastrum paniculatum</i>   |       |                |                |

P.C. = Periodo de Carencia en días.

L.M.R. = Límite máximo de residuos.

(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

**“Los períodos de carencia indicados en las recomendaciones de uso son para las condiciones locales. Según el artículo 42 del D.S. N° 006-2016-MINAGRI, para fines de exportación el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino”**

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

**Convey®SC** debe ser aplicado en post-emergencia temprana del maíz entre 4 a 6 hojas desplegadas (contando la primera hoja cotiledonal) y con malezas entre 2 a 4 hojas.

El tratamiento con **Convey®SC** debe ser aplicado cuando las malezas y el maíz se encuentren en crecimiento activo.

Realizar una aplicación por campaña/año como máximo

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <p>Rotación de cultivos: luego de un maíz aplicado con <b>Convey®SC</b> se puede sembrar sin restricción: cualquier tipo de maíz. 3 meses después: crucíferas (brócoli, col, coliflor) y arveja. 9 meses después: alfalfa, frijol. Lechuga, papa. En caso de duda consulte a nuestro departamento técnico.</p>                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>MOMENTO DE APLICACIÓN</b></p>     | <p>Aplicación post-emergente temprana del maíz entre 4 a 6 hojas desplegadas y con malezas de 2 a 4 hojas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>PREPARACIÓN DE LA MEZCLA</b></p>  | <p>Llenar el tanque con agua hasta la mitad, agregar la cantidad correspondiente de <b>Convey®SC</b> diluyéndolo, luego completar a volumen total con agua. Después de una ligera agitación la solución se encuentra estable y lista para ser aplicada.</p> <p><b>Convey®SC</b> puede aplicarse con equipo manual o mecánico con presión constante. Calibrar el equipo antes de aplicar el producto. Para la aplicación utilice boquillas cónicas</p> <p>Lave el equipo después de cada jornada de trabajo.</p> |
| <p><b>COMPATIBILIDAD</b></p>            | <p>Se debe evitar aplicar <b>Convey®SC</b> con productos de reacción alcalina, sin embargo, se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>FITOTOXICIDAD</b></p>             | <p>Bajo las condiciones de uso recomendadas, el producto no es fitotóxico para el cultivo de maíz.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>REINGRESO AL ÁREA TRATADA</b></p> | <p>Se recomienda no ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

FECHA DE REVISION: MAYO 2020

**BASF Peruana S.A**  
 Oficinas y Fábrica  
 Av . Oscar R. Benavides 5915  
 Callao, Lima - Perú  
 Central +51 1 513-2500  
 Fax +51 1 513-2518  
 E-mail basfperu@basf.com  
 www.basf.com.pe

**Representantes exclusivos**  
 De BASF SE  
 67056 Ludwigshafen  
 Alemania

**Registro**  
 Inscrita en la partida N° 11007979  
 de la Oficina Registral de Lima y Callao

**Certificación ISO 9001:2008**  
 Certificado PE13/175158  
 "Fabricación y Comercialización de  
 Productos Químicos para la Industria en  
 General y Comercialización de Productos  
 para la Protección de Cultivos"

