

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Peligroso si es inhalado. Causa irritación moderada a los ojos.
- Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto
- Puede perjudicar a determinados órganos (Sistema nervioso) por exposición prolongada o repetida.
- Mantener alejados a los niños y animales del lugar de la aplicación.
- No aplicar en dirección contraria al viento.
- Uselo de sus envases originales y almacénelo herméticamente cerrado en lugares frescos y ventilados, alejado de fuentes de calor, bajo llave.
- Usar máscara, respirador, guantes protectores, pantalón y camisa de manga larga al momento de preparar el caldo de aspersión y al aplicar el producto.
- No comer, beber ni fumar durante la mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No se debe almacenar ni transportarlo conjuntamente con productos alimenticios (frescos o en conservas), bebidas, forrajes ni medicinas.
- Después de usar el producto, cambiarse de ropa, bañarse con abundante agua y jabón y lavar la ropa contaminada.
- No reingresar a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

**Grupo químico: Ácido Aminofosfínico.**

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta. En caso de contaminación de la piel, lave inmediatamente las partes afectadas con abundante agua y jabón. Mantenga al paciente animado y caliente, al aire fresco y en posición horizontal. Lave inmediatamente los ojos contaminados con abundante agua pura durante 10 a 15 minutos. Si el producto ha sido ingerido induzca al vómito, sólo si el paciente está consciente.
- Antídoto: no existe antídoto específico.

**TELEFONOS DE EMERGENCIA**

**SAMU: 106**

**CISPROQUIM (línea gratuita): 0 800 50 847**

**BASF Peruana S.A.: 513 2505**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# Basta®

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**HERBICIDA AGRICOLA**

**CONCENTRADO SOLUBLE (SL)**

**COMPOSICION:**

Glufosinato de amonio ..... 200 g/L  
Aditivos ..... c.s.p 1 L

Reg. PQUA N°183-SENASA

**FORMULADO POR:**

**BASF S.A.**  
Av. Brasil, 791  
Bairro Eng. Neiva  
Guaratinguetá SP - Brasil



We create chemistry

**TITULAR DEL REGISTRO,  
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO  
POR:**

**BASF Peruana S.A.**  
Av. O. R. Benavides 5915 – Callao  
Casilla 3911, Lima 100  
Telf: (01) 513 2500  
Fax: (01) 513 2519

**Contenido Neto: 1 L**

**N° de Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:**

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

-Basta® es un herbicida de contacto, no selectivo, parcialmente sistémico, que sólo puede ser absorbido vía foliar. El glufosinato de amonio inhibe la actividad de la enzima glutaminasintetasa, perturbando el metabolismo de amonio en la planta, dando como resultado una acumulación de amoniaco (NH<sub>3</sub>) en las células de la planta, destruyéndolas. Los efectos fitotóxicos son acelerados por la luz.  
-Agite el producto antes de utilizarlo. Llenar el tanque del equipo aplicador con agua limpia hasta la mitad en recipiente aparte mezclar el producto en agua hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque del equipo y complete el volumen de agua a utilizar. Realice la aplicación dirigida a la maleza utilizando un equipo con campana.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS			*PC (días)	**LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/ha	%	L/cil 200 L		
Alcachofa	Yuyo hembra	<i>Amaranthus spp.</i>	2	-	1	25	0.1
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>					
Cacao	Caminaadora	<i>Rottboellia exaltata</i>	3	0.75	1.5	14	0.1
Café	Remolina	<i>Paspalum spp.</i>	3 - 5	0.75-1.25	1.5-2.5	14	0.1
Caña de azúcar	Gramma china	<i>Sorghum halepense</i>	3	-	-	14	0.5
	Gramma dulce	<i>Cynodon dactylon</i>					
Espárrago	Gramma china	<i>Sorghum halepense</i>	2 - 2.5	-	1.2	1	0.2
	Hierba de gallinazo	<i>Chenopodium murale</i>					
Manzano	Coquito	<i>Cyperus spp.</i>	3 - 5	0.75-1.25	1.5-2.5	14	0.1
Naranja	Gramma china	<i>Sorghum halepense</i>	3 - 5	0.75-1.25	1.5-2.5	14	0.1
Palma aceitera	Remolina	<i>Paspalum spp.</i>	3 - 5	0.75-1.25	1.5-2.5	14	n.a.
Palto	Yuyo hembra	<i>Amaranthus hybridus</i>	1.5 - 2	-	-	20	0.1
	Gramma china	<i>Sorghum halepense</i>					
	Pajilla	<i>Chloris virgata</i>					
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>					
Quinua	Tomatillo	<i>Nicandra physaloides</i>	2	-	-	60	0.1
	Moco de pavo	<i>Echinochloa colonum</i>					
	Leptochloa	<i>Leptochloa filiformis</i>					
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>					
	Hierba gallinazo	<i>Chenopodium murale</i>					
Te	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>	1 - 3	0.25-0.75	0.5-1.5	14	0.1
	Hierba mora	<i>Solanum nigra</i>					
	Yuyo	<i>Amaranthus viridis</i>					
Vid	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	1 - 3	0.25-0.75	0.5-1.5	14	0.2

\* PC = Período de Carenia \*\*LMR = Límite Máximo de Residuos n.a.= no aplica.

Nota: Las concentraciones en % están basadas en un gasto de agua promedio de 400 L de agua por ha, cuando se aplican con pulverizadora manual de mochila.

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:** Debe aplicarse en post-emergencia, sobre malezas jóvenes de 15 a 20 cm de tamaño que tengan suficiente follaje. Se recomienda hasta dos aplicaciones por campaña.

Quinua: aplicarlo en forma dirigida sobre malezas de 5 a 20 cm de tamaño con suficiente follaje; en plantas jóvenes de quinua de aproximadamente 30 días de edad después de la siembra.

**PERIODO DE REINGRESO:** 24 horas

**COMPATIBILIDAD:** Se puede aplicar en mezcla con diuron, linuron, ametrina, alaclor, metribuzina, metolaclor, atrazina, dependiendo del cultivo.

**FITOTOXICIDAD:** La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

"El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto"

