

FICHA TÉCNICA
Siege® Pro
Insecticida Granulado

“USO DOMÉSTICO”

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

| | | |
|--|--------------|---------------------------|
| Ingrediente activo Hidrametilona (Equivalente a 7.3 gr/Kg) | No menos de: | % EN PESO 0.73% |
| Ingredientes inertes Ácido oleico, aceite de soya y conservador. | No más de: | 99.27 % |
| | Total | 100.00% |

REG. RSCO-DOM-INAC-181-308-005-0.730

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR:

BASF MEXICANA S.A. DE C.V.
AV. INSURGENTES SUR 975,
COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES,
C.P. 03710, CIUDAD DE MÉXICO.
TEL: 01 (55) 5325-2600

“INSTRUCCIONES DE USO”

| TRATAMIENTO | DOSIS | RECOMENDACIONES |
|--|-----------------------------|--|
| Individual por hormiguero Hormiga de fuego Hormiga trozadora Hormiga cabezona | 5 cucharaditas (20-25 g) | Distribuir el cebo uniformemente alrededor de la base del hormiguero, no aplicar directamente en la cima del mismo. No aplicar más de 1.5 Kg. de cebo por hectárea. |
| Hormiga de fuego Hormiga trozadora Total | 1.1 – 1.6 Kg/ha | Esparcir el cebo uniformemente con equipo mecánico (de discos) o aéreo. |
| Hormiga cabezona Total | 1.1 – 2.2 Kg/ha | Esparcir el cebo uniformemente con equipo mecánico (de discos) o aéreo. |

Método de aplicación.



We create chemistry

Aplicar cuando las hormigas estén en actividad (generalmente cuando la temperatura del suelo es mayor a 15 C.). Cuando se espera lluvia o el suelo tiene mucha humedad, no aplique **Siege® Pro**. Aplique de preferencia por la mañana o por la tarde.

Siege® Pro es un cebo altamente atractivo para hormigas de fuego y cabezonas. Este trabaja siendo parte de la cadena alimenticia de las hormigas. Las hormigas encontrarán el cebo **Siege® Pro** y lo llevarán al hormiguero para alimentar a la reina y a las demás. No se debe molestar al hormiguero durante la aplicación. Un insecticida para hormigas eficiente, debe actuar despacio para que pueda ser llevado por las hormigas a través del hormiguero hasta la reina.

Siege® Pro es un insecticida de acción lenta y en especial efectivo contra la reina. Generalmente en 1 a 4 semanas la reina y un gran número de hormigas morirán. Dentro de 2 a 8 semanas se observará una reducción en la actividad del hormiguero. Los hormigueros muy grandes pueden continuar su actividad por cierto tiempo aún cuando la reina haya muerto y no habrá más reproducción

INFORMACIÓN ADICIONAL: custodia@basf.com