



We create chemistry

FICHA TÉCNICA

Phantom®

Clorfenapyr
Insecticida / Suspensión concentrada

“APLICACIÓN URBANA”

“COMPOSICION PORCENTUAL”

		% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO: Clorfenapyr: 4-bromo-2-(4-clorofenil)-1-etoximetil-5-trifluorometil pirrol-3-carbonitrilo (Equivalente a 240 g de i.a./L)	No menos de	21.44%
INGREDIENTES INERTES: Dispersante, estabilizador, antiespumante, anticongelante, preservador, agente de suspensión, espesante, neutralizador y solvente (agua).	No más de	78.56%
	TOTAL:	100%

Registro Sanitario No.: RSCO-URB-INAC-0102A-303-064-021

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MEXICO POR:

BASF MEXICANA, S.A. DE C.V.
AV. INSURGENTES SUR 975
COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES
C.P. 03710, CIUDAD DE MÉXICO.
TEL. 01 (55) 5325-2600

Instrucciones de uso

Protección al trabajador: Las personas que apliquen este producto deben tomar las precauciones y usar el equipo de protección enunciadas en la parte izquierda de la etiqueta.

Protección a la población: Al momento de las aspersiones tomar precauciones para que la población no entre en contacto directo con el producto, de suceder lo anterior, aplicar las medidas de emergencia anunciadas en la etiqueta.

Phantom ® es un insecticida que puede aplicarse en alcantarillas, zoológicos, tiendas de mascotas, hoteles, restaurantes, plantas industriales, oficinas, supermercados, escuelas, casas, edificios, almacenes, hospitales, barcos, ferrocarriles, camiones. Actúa por ingestión y contacto en las siguientes plagas:

Nombre común	Nombre científico	Dosis y método de aplicación
Termitas: Subterráneas De la madera seca De nidos acartonados	<i>Reticulitermes spp.</i> , <i>Zootermopsis spp.</i> , <i>Heterotermes spp.</i> , <i>Coptotermes spp.</i> <i>Marginitermes hubbardi</i> <i>Cryptotermes spp</i> <i>Kaloterme spp</i> <i>Nasutitermes spp</i>	El objetivo de tratar la tierra con Phantom® es establecer una barrera tratada (horizontal y/o vertical según sea necesario) entre la madera y otro material celuloso en la estructura y las poblaciones de termitas en el suelo. Para situaciones típicas de tratamiento aplique una concentración del 0.125% (500 ml de Phantom® en 86 L de agua). Cuando haya infestaciones severas aplique una concentración de 0.25% (1L de Phantom® en 86 L de agua).
Cucarachas Germánica De bandas cafés Café Oriental Americana	<i>Blatella germánica</i> <i>Supella supellectilium</i> <i>Periplaneta fuliginosa</i> <i>Blatta orientalis</i> <i>Periplaneta americana</i>	Aplique una dilución de 0.5% (230 ml en 10L de agua) como un rocío grueso localizado de baja presión en grietas y hendiduras donde éstas plagas habitan comúnmente o suelen infestar. También las aplicaciones pueden hacerse en superficies debajo de muebles, espacios entre juntas de muebles, detrás de fregaderos, armarios, plomería, gabinetes y otras áreas donde puedan esconderse las cucarachas. De ser necesario vuelva a aplicar cada 4 semanas.
Hormigas: Cosechadora De fuego Argentina Faraona De cabeza grande Del pavimento Pequeña hormiga del fuego Doméstica Carpintera	<i>Pogonomirmex sp</i> <i>Solenopsis spp</i> <i>Iridomyrmex humilis</i> <i>Monomorium pharaonis</i> <i>Pheidole megacephala</i> <i>Tetramorium sp</i> <i>Wasmania auropunctata</i> <i>Tapinoma spp</i> <i>Camponotus spp</i>	Aplique una dilución de 0.5% (230 ml en 10 L de agua) en grietas, hendiduras donde las plagas habitan comúnmente, de ser posible aplique directamente a los nidos de las hormigas. De ser necesario vuelva a aplicar cada 4 semanas.
Otras plagas: Moscas Mosquitos Avispas Pulgas Chinches Chinches de cama Pescadito de plata Grillo Cochinillas Tijerilla Alacranes Arañas Ciempiés Gorgojos	<i>Musca domestica, Fannia spp, Drosophilla spp</i> <i>Culex spp, Aedes spp, Anopheles spp</i> <i>Vespula spp</i> <i>Xenopsylla spp, Ctenocephalides spp</i> <i>Triatoma spp., Rhodnius prolixus</i> <i>Cimex spp.</i> <i>Lepisma spp.</i> <i>Acheta domesticus.</i> <i>Isopoda</i> <i>Forficula auricularia</i> <i>Centruroides spp</i> <i>Lactrodectus mactans, Loxosceles spp.</i> Quilópodos y diplópodos. <i>Tribolium castaneum, Sitophilus oryzae,</i> <i>Trogoderma granarium, Tenebroides sp.</i>	Aplique una dilución de 0.5% (230 ml en 10 L de agua) como un rocío grueso localizado de baja presión en grietas y hendiduras donde éstas plagas habitan comúnmente o suelen infestar.

Los intervalos de aplicación deben ser superiores a cuatro semanas.

Tiempo de reentrada: Una vez que el producto haya secado.

Método para preparar y aplicar el producto.

Las mezclas deben de hacerse de la siguiente manera:

- a) Vacíe el agua en el tanque hasta $\frac{3}{4}$ partes de la requerida.
- b) Mida la cantidad de **Phantom®** necesario.
- c) Añada **Phantom®** al tanque y llene con el resto de agua.
- d) Cierre el aspersor y agite para conseguir una suspensión apropiada.
- e) Vuelva a agitar el aspersor antes de volver a usarlo si se interrumpe momentáneamente el tratamiento.

Contraindicaciones.

No aplique **Phantom®** durante la preparación de alimentos o manipulación de forrajes.

Incompatibilidad.

Phantom® debe de aplicarse sólo no se recomienda su uso en mezcla con otros plaguicidas.

INFORMACIÓN ADICIONAL: custodia@basf.com