

Concentrado emulsionable
Herbicida
Uso agrícola
Reg. Nal. ICA 3169
Actualización: 09 de octubre de 2018

 **BASF**
We create chemistry

H

Aura[®] 20 EC

AURA[®] 20 EC es un herbicida post-emergente sistémico, selectivo al arroz, recomendado para el control específico de malezas gramíneas.

DOSIS:

Aplice AURA[®] 0.75 L/Ha cuando el arroz tenga 4 hojas (aproximadamente 20 DDG) y las gramíneas de 2 hojas a una macolla y en activo crecimiento. En aplicaciones tardías (rescates) utilice AURA[®] 1.0 L/Ha. Procure un volumen suficiente de mezcla para lograr un buen cubrimiento de las malezas. AURA[®] 20 EC debe ir siempre acompañado de Dash[®] HC a las dosis y volúmenes de aplicación a continuación descritos:

Tipo de aplicación	Volumen de mezcla	Dosis/Ha Dash [®]
Aérea	56 - 80 L/Ha	0.35
Terrestre	100 - 150 L/Ha	0.60

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes activos:

Profoxydim 200 g/L de formulación a 20 °C.

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Concentrado emulsionable
Herbicida
Uso agrícola
Reg. Nal. ICA 3169
Actualización: 09 de octubre de 2018

BASF
We create chemistry

RECOMENDACIONES DE USO

Aplique siempre en mezcla con DASH® EC para garantizar cobertura y eficacia.

CULTIVO	Maleza	Dosis L/Ha.
Arroz	Liendre puerco (<i>Echinochloa colonum</i>) Falsa caminadora (<i>Ischaemum rugosum</i>) Caminadora (<i>Rottboelia cochinchinensis</i>) Guarda rocío (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Paja mona (<i>Leptochloa filiformis</i>) Eragrostis (<i>Eragrostis spp</i>)	0.75

AURA® 20 EC debe ser aplicado dentro de un programa de manejo integrado de malezas, en rotación con otros herbicidas de diferente mecanismo de acción, siguiendo las recomendaciones del Comité de Prevención de resistencia a Herbicidas HRAC. Evite la aplicación de AURA® 20 EC en lotes que presenten malezas con pérdida de sensibilidad a herbicidas del grupo de las ACCasas.T





COMPATIBILIDAD

AURA® 20 EC es compatible con herbicidas residuales como Prowl® 400, Prowl® H2O, clomazone y oxadiazon, así como con insecticidas piretroides, organofosforados y carbamatos. No mezclar AURA® 20 EC con herbicidas post emergentes como 2,4 D, picloran, ioxinil, bentazon, triclopyr y sulfonilureas ya que se presenta un marcado antagonismo, espere entre 5 y 8 días antes o después de la aplicación de AURA® 20 EC para la aplicación de sulfonilureas.

FITOTOXICIDAD:

Antes de aplicar en el cultivo del Arroz, se debe drenar el lote, no se debe aplicar sobre lámina de agua, es necesario evitar la presencia de charcos.

Debido a la menor tolerancia al producto de algunas variedades de Arroz, consulte a su ingeniero agrónomo sobre susceptibilidad del material, utilización, dosis de AURA® 20 EC y Dash y estado óptimo de desarrollo del cultivo al momento de la aplicación.

ADVERTENCIA:

El fabricante garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines aquí recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo.

PRESENTACIÓN: Combipack 1.0 L.

PRECAUCIONES:

Mantenga el producto en su empaque original, con la etiqueta en buen estado, bien tapado, en lugar fresco y aireado, lejos de alimentos, drogas y forrajes, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS y animales domésticos, nunca en el mismo lugar donde se duerme, come o preparan los alimentos. No permanezca en la nube de aspersión. Evite el contacto con la piel y los ojos. No fume, coma o beba mientras manipula el producto. Al terminar, cámbiese de ropa y báñese con abundante agua y jabón, en especial las partes del cuerpo expuestas al producto. No arroje los sobrantes a ríos o acequias.



PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de ingestión NO provoque el vómito. Administre carbón activado. Lleve la persona inmediatamente al médico junto con la etiqueta del producto. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por mínimo 15 minutos y solicite rápidamente atención médica. En caso de contacto con la piel, retire la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

En caso de derrame, recoger con material absorbente, guardarlo en canecas o bolsas plásticas y deseche acorde con la entidad local competente.

No asperjar áreas fuera del cultivo a tratar. Lave el equipo en el sitio de aplicación y deseche esa agua en el área tratada.

No contaminar lagos, ríos, estanques, pozos ni arroyos con desechos o envases vacíos.

Respete las franjas de seguridad en relación a cuerpos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, o cualquier otra área que requiera protección especial.

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta el agua en la mezcla de aplicación, evitando salpicaduras, luego inutilícelo perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimentos o agua para el consumo.

En caso de intoxicación llamar a CISPROQUIM. Teléfonos 01 8000 916012 o (1) 2886012 en Bogotá D.C. Servicio 24 horas.