

Diamant[®]

Fungicida

Único fungicida que incrementa
la tolerancia al estrés hídrico o térmico.

 **BASF**

The Chemical Company

Diamant®

Fungicida

(Fenpropimorfo + F500® + Epoxiconazol)

Innovador fungicida BASF para el control de enfermedades en trigo, cebada y otros cereales. **Diamant®** es el único fungicida en cereales que posee los beneficios de la tecnología **AgCelence®**.

Beneficios de Diamant®

- Fungicida sistémico con acción preventiva, curativa y erradicante.
- Prolongada persistencia de acción.
- Mejor penetración, mayor control y consistencia en su acción.

¿Qué es AgCelence®?

Son efectos fisiológicos que se desencadenan en las plantas al aplicar **Diamant®** y que maximizan la calidad y el rendimiento del cultivo, más allá de las prácticas de manejo conocidas.

Beneficios AgCelence®

- Aumenta la eficiencia fotosintética del cultivo.
- Mejora la eficiencia de uso de la energía y la utilización del nitrógeno.
- Reduce los daños producidos por estrés hídrico o térmico.
- Alto rendimiento y calidad superior aún en ausencia de enfermedades.
- Aumenta la resistencia de las plantas a enfermedades.

Instrucciones de uso

Cultivos	Enfermedad	Dosis	Observaciones
Trigos (blancos y candeales)	Roya estriada (<i>Puccinia striiformis f.sp.tritici</i>), roya de la hoja (<i>Puccinia triticina</i>), septoriosis (<i>Septoria tritici</i> = <i>Mycosphaerella graminicola</i>), oídio (<i>Blumeria graminis</i>)	1,0 – 2,0 L/ha	Aplicar Diamant® , de preferencia, en forma preventiva a fines de macolla o inicio de encañado y/o con espiga recién expuesta. Aplicar 1,5 a 2,0 L/ha a inicio de encañado a espigadura para lograr los mayores efectos residuales de control. Con espiga emergida, aplicar 1,0 a 1,5 L/ha para mantener el cultivo libre de enfermedades hasta cosecha.
Cebada	Roya estriada (<i>Puccinia striiformis f.sp.hordei</i>), roya de la hoja (<i>Septoria passerinii</i>), oídio (<i>Blumeria graminis</i>), rincosporiosis (<i>Rhynchosporium secalis</i>), helmintosporiosis o mancha en red (<i>Drechlera teres</i> = <i>Pyrenophora teres</i>)		Utilizar las dosis menores en caso de baja presión de las enfermedades. Aplicar a través de un pulverizador convencional utilizando 150 - 200 L de agua/ha. En aplicaciones aéreas utilizar 30 a 50 L de agua/ha.
Avena	Roya coronada (<i>Puccinia coronata</i>), roya de la caña (<i>Puccinia graminis</i>), septoriosis (<i>Septoria avenae</i>), oídio (<i>Blumeria graminis</i>)		Número máximo de aplicaciones por temporada: 2.



© es marca registrada. Leer la etiqueta antes de usar el producto.

BASF Chile S.A.: Santiago: Carrascal 3851. Fono: (2) 26407231. La Serena: Fono: 92243435. San Felipe: Fono: 93215370. Rancagua: Fono: 96432089. Curicó: Fono: 93267973. Chillán: Fono: 93288779. Temuco: Panamericana Sur 4750. Fono: 97464533. Osorno: Fono: 93285393

www.basf.cl/agro



Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí están expuestas con el mejor de nuestros conocimientos y son consideradas correctas hasta la fecha del presente documento, son sólo de carácter referencial y de ninguna manera sustituye la información entregada en la etiqueta adherida en los envases de los productos BASF. De acuerdo a esto, la única información válida y que respalda el adecuado uso y manejo de los productos es aquella contenida en la etiqueta adherida en los envases de los productos BASF.