

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa utilizada y báñese con abundante agua y jabón.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Benzofenona

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
En caso de contacto con la piel: Remover la ropa contaminada, lavar la piel con agua y jabón.
En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si la irritación persiste consulte con el oftalmólogo.
En caso de ingestión: No inducir el vómito. No suministrar nada por la vía oral.
En caso de inhalación: Mantener al paciente calmado y trasladarlo a un lugar fresco con ventilación natural. Solicitar atención médica.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
CICOTOX: 0800-1-3040 (línea gratuita)
BASF Peruana S.A.: (01) 513 2505

Nota al médico:

No se conoce antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático, lavado estomacal, purgante salinos y respiración artificial.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para organismos acuáticos.
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
Evitar que el producto se aplique en suelos altamente permeables.
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Vivando®SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

COMPOSICIÓN:

Metrafenone..... 500 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N ° 239 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO,
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
BASF Peruana S.A.

Av. O. R. Benavides 5915-Callao
Casilla 3911, Lima 100
Telf: (01) 513 2500
Fax: (01) 513 2519



FORMULADO POR:
BASF Agri Production SAS
Zone Industrielle
Lyon Nord 69727
Genay - Francia

CONTENIDO NETO: 1 L

No. DE LOTE:

FECHA DE FORMULACION:

FECHA DE VENCIMIENTO:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

® Marca registrada BASF

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Vivando®SC es un fungicida de acción sistémica con actividad protectante y curativa. Actúa impidiendo la penetración del hongo en el tejido de la planta. Ataca los estados vegetativos y reproductivos del hongo, previene la formación de aporiosos, y causa malformaciones en el micelio. Metrafenone pertenece al grupo FRAC U 8.
Llenar el tanque o cilindro hasta un tercio con agua (limpia), agregar la dosis recomendada para la plaga y cultivo, completar con agua y agitar constantemente hasta lograr una mezcla homogénea. Agitar la mezcla antes de llenar el equipo de aplicación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.3	28	0.05
Manzano	Oidium	<i>Podosphaera leucotricha</i>	0.3	28	0.05
Melocotón	Oidium	<i>Sphaerotheca pannosa</i>	0.20-0.25	14	0.05
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.3	3	2.0
Vid	Oidium	<i>Uncinula necator</i>	0.25 - 0.30	28	5.0

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Realice hasta dos aplicaciones por campaña/año.
En el caso de alcachofa las aplicaciones se deben realizar durante las etapas de crecimiento vegetativo – floración. En vid y manzano, realizar las aplicaciones cuando se alcance un nivel promedio de infección de 3 – 5%. En melocotón aplicar hasta floración antes de cuajado de frutos. En pimiento aplicar preventivamente en la etapa inicial de desarrollo del cultivo.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas

COMPATIBILIDAD:


Vivando®SC se puede mezclar con la mayoría de fungicidas, insecticidas, no es compatible con los plaguicidas de reacción alcalina. Se recomienda que las mezclas con productos comerciales sean sometidas a pruebas preliminares de compatibilidad física, química y de eficacia biológica.

FITOTOXICIDAD:

No se ha reportado efectos tóxicos en los cultivos tratados a las dosis que se indican en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

