



We create chemistry

FICHA TÉCNICA

Forum[®] SC

dimetomorf

Fungicida / Suspensión Capsulada

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

INGREDIENTES ACTIVOS:	% EN PESO
Dimetomorf: (EZ)-4-[3-4(4-clorofenil)-3-(3,4-dimetoxifenil)acronil]morfolina..... (Equivalente a 500 g de i.a./L a 20°C)	43.10 %
INGREDIENTES INERTES: Dispersantes, humectante, agente de suspensibilidad, antiespumante, preservativo y diluyente	56.90 %
TOTAL:	100.0 %

REG.RSCO-FUNG-0301D-308-407-043

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR: BASF MEXICANA, S.A. DE C.V.

AV. INSURGENTES SUR 975
COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES
03710, CIUDAD DE MÉXICO
TEL. 01 (55) 5325-26-00

INSTRUCCIONES DE USO

Forum[®] SC es un fungicida para el control preventivo y posee acción protectora y antiesporulante.

CULTIVO	ENFERMEDAD	Dosis (L/ha)	OBSERVACIONES
Pepino (0) Melón (0) Sandía (0) Calabaza (0) Calabacita (0)	Mildiu <i>Pseudoperonospora cubensis</i>	0.6	Iniciar las aplicaciones cuando las condiciones climáticas sean favorables para el desarrollo del hongo y antes de que aparezcan los síntomas visibles de infección, continuar con las aplicaciones a intervalos de 5 a 7 días. Durante el ciclo del cultivo no hacer más de 4 aplicaciones consecutivas sin intercalar con fungicidas de distinto modo de acción.
Tabaco (Sin límite)	Moho azul <i>Peronospora tabacina</i>	0.5 - 0.7	
Jitomate (4) Papa (1)	Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i>	0.6	
Lechuga (0)	Mildiu <i>Bremia lactucae</i>	0.55	

Chile (SL) Chile bell (SL) Berenjena (SL) Tomate de cáscara (4) Jitomate (4)	Marchitez del chile <i>Phytophthora capsici</i>	0.5 – 1.5	Realizar tres aplicaciones en “drench”, la primera cuatro días después del trasplante, repetir a los 18 y 39 días depositando 20 ml de solución por planta. No realizar más de tres aplicaciones por ciclo del cultivo.
Cebolla (SL) Ajo (SL) Puerro (SL)	Mildew <i>Peronospora destructor</i>	0.75 a 1.0	Realizar dos aspersiones al follaje a intervalos de 12 días. Iniciar las aplicaciones cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad o al observar los primeros síntomas.
Espárrago (30)	Pudrición de la raíz del espárrago <i>Phytophthora megasperma</i>	0.75 – 1.0	Realizar dos aplicaciones en “drench” a la base de la planta a intervalo de 14 días, con un volumen de aplicación de 70 ml de la mezcla/planta.
Cultivo en condiciones de agricultura protegida			
Jitomate (4) Chile (SL) Chile bell (SL)	Marchitéz <i>Phytophthora capsici</i>	2.0 a 3.0 ml por litro de agua	Aplicar cuatro días después del trasplante, depositando 20 ml de la solución en el cuello de la planta (drench). Realizar tres aplicaciones con intervalo de 27 días.

Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha

Tiempo de reentrada a los lugares tratados: 4 horas después de la aplicación.

Métodos para preparar y aplicar el producto:

Preparación de la solución. El envase del producto debe abrirse cuidadosamente usando el equipo de protección indicado en la parte izquierda de la etiqueta. Agregar agua limpia al tanque de aspersión hasta la mitad de su capacidad, vierta la cantidad recomendada de **Forum® SC** inicie la agitación, luego llene el tanque con agua. La agitación debe ser continua durante la aspersión al cultivo.

Forma de aplicación. En cobertura total del cultivo. Cuando el desarrollo del cultivo es avanzado, las aspersiones de **Forum® SC** deberán hacerse de ambos lados del surco para lograr una cobertura completa y uniforme del follaje. La cantidad de agua por hectárea dependerá de la etapa de crecimiento de la planta: usualmente se requerirá un volumen de caldo de 400-700 L/ha en el cultivo totalmente desarrollado.

Forma de aplicación en “drench o remojo”. Esta aplicación se puede realizar con el equipo de aspersión convencional calibrada correctamente para un gasto de 20 ó 70 ml de solución por planta. La aspersión consiste en aplicar directamente a la base de la planta hasta asegurar un buen remojo.

Contraindicaciones:

Las aplicaciones deben realizarse de preferencia por la mañana o por la tarde. No aplicar cuando la velocidad del viento sea mayor a 15 km/hr. **Forum® SC** no es fitotóxico a las dosis recomendadas y utilizado de acuerdo a las instrucciones de uso de esta etiqueta.

Incompatibilidad:

Forum® SC es compatible con la mayoría de los productos registrados para su uso en los cultivos indicados en esta etiqueta, no mezclarlos con productos de fuerte reacción alcalina.

“Manejo de Resistencia”

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LA DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO



CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”

Para reducir el potencial de resistencia a las aplicaciones de **Forum® SC** recomendamos aplicar un máximo de 2 veces seguidas en bloque y debe alternarse con otro fungicida que pertenezca a un grupo químico diferente y con diferente modo de acción, posteriormente se podrá aplicar nuevamente **Forum® SC**. No realizar más de 4 aplicaciones por ciclo/año.

INFORMACIÓN ADICIONAL: custodia@basf.com