

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- **Gro 500™** es cianamida hidrogenada estabilizada que pertenece al grupo químico de las cianamidas.
- No ingerir bebidas alcohólicas durante 48 horas antes y después de la manipulación del producto.
- **Gro 500™** no diluido es corrosivo.
- No fume, coma o beba durante el uso de este producto.
- Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.
- **No almacenar Gro 500™ a temperaturas superiores a 20°C, ya que puede cristalizar parcialmente.**
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación usar guantes de goma, botas de goma, delantal impermeable, overol impermeable, protector facial. Durante la aplicación usar guantes de goma, botas de goma, delantal impermeable, overol impermeable, protector facial.
- Para seguridad del operario se recomienda aplicar **Gro 500™** sólo con equipos de barra o nebulizador.
- Aleje los animales domésticos y personas extrañas. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplique con viento.
- No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.
- Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo separadamente de la ropa doméstica.
- Lavarse prolijamente con agua y jabón antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.
- Después de la aplicación, lave inmediatamente el equipo de aplicación con abundante agua.

Síntomas de intoxicación: Puede producir hipotensión, aceleración del pulso, náuseas, sensación de calor, dolores de cabeza.

Primeros auxilios:

- **Contacto con los ojos:** Lávelos inmediatamente con agua corriente por lo menos 15 minutos manteniendo los párpados separados. **Gro 500™** es irritante para los ojos. Consulte un médico.

- **Contacto con la piel:** Lávela inmediatamente con agua y jabón. Quitarse y lavar la ropa contaminada. **Gro 500™** es irritante para la piel. Consulte un médico.

- **Inhalación:** proporcione aire fresco. Mantenga al paciente en reposo. Si es necesario llame a un médico.

- **Ingestión:** El producto puede ser mortal si es ingerido. En caso de ingestión, si no está accequible un médico y si la persona está consciente, administre medio litro de agua y provoque el vómito. Lleve a la persona cuanto antes al médico para tratamiento inmediato.

Tratamiento médico de emergencia: En caso de daño severo en la piel, use un ungüento de cortisona o penicilina para mejorar el desarrollo del tejido y prevenir infecciones secundarias. En caso de ingestión practique lavado gástrico. El tratamiento posterior es sintomático y de sostén.

Antídoto: no se conoce antídoto específico.

Riesgos ambientales: **Gro 500™** es tóxico para peces; no contamine cursos de agua. Es tóxico para abejas, moderadamente tóxico para aves.

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”, “EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”. “NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL”. “NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”. “NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO”. “LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”. “REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”.

Procedimiento para el triple lavado:

1. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase; Cierre el envase, agite durante 30 segundos. Vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Repita este proceso 3 veces.
2. Perfore el envase para evitar su reutilización.

Teléfonos de emergencia:

BASF Chile S.A. (56 2) 2640 7000

CITUC(Convenio CITUC/AFIPA): (56 2) 2635 3800 (**Atención las 24 horas**),

CITUC Químico (Emergencia química): (56 2) 2247 3600

Nota al comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por da?os eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

BASF

The Chemical Company

Gro 500™

Fitorregulador Concentrado soluble (SL)

Fitorregulador utilizado en los frutales indicados en el cuadro de Instrucciones de Uso, para romper la dormancia y estimular la brotación de las yemas y/o floración.

Composición:

Cianamida Hidrogenada*52% p/v (520 g/L≈490 g/kg)

Coformulantes, c.s.p.....100% p/v (1 L)

(*) Cianamida de hidrógeno

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°: 4184

CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

Lote:

Vencimiento:

Contenido neto: 20 Litros

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Fabricado por:

AlzChem AG

Dr.-Albert-Frank-Stra?e 32

D-83308 Trostberg

Alemania

® Marca Registrada AlzChem

Importado y Distribuido por

BASF Chile S.A.

Carrascal 3851

Fono: (56 2) 2640 7000

Casilla 3238

Santiago-Chile

INSTRUCCIONES DE USO

Cultivo	Objetivo	Dosis L/100 L agua	Observaciones
Vides (de mesa, vinífera y pisquera)	Gro 500™ puede adelantar la brotación, el desarrollo vegetativo y la cosecha. Uniformiza la brotación y el desarrollo vegetativo, por lo tanto, facilita y mejora la eficiencia de las labores culturales y aplicaciones de productos fitosanitarios. Considerando la diversidad climática, la Época de aplicación se debe adaptar a las condiciones locales.	5	Vid de mesa y pisquera: Aplicar durante el receso invernal, alrededor de 45 a 30 días antes de la fecha normal de brotación. Preferir la fecha más temprana, cuando se desee adelantar la brotación. Vid vinífera: Aplicar durante el receso invernal, entre 30 y 25 días antes de la brotación normal de cada variedad para evitar daños por heladas, producto de una brotación anticipada. Pulverizar hacia cargadores y pitones hasta punto de escurrimiento, asegurando un buen cubrimiento. El volumen de agua por hectárea depende de la edad y del sistema de poda de las parras. Aplicaciones por temporada: 1.
Perales (Variedad Winter Nelis)	Gro 500™ adelanta la floración del polinizante (Winter Nelis en huertos de Packam's Triumph, cuando se aplica solamente en la variedad Winter Nelis.	3	Época de aplicación: Dependiendo de la cantidad de horas de frío y región en donde se ubican las plantaciones, esta puede variar entre la primera y segunda quincena de julio (alrededor de 60 a 55 días antes de la fecha normal de floración de la variedad tratada). Mojar hasta punto de escurrimiento, asegurando un buen cubrimiento. Gro 500™ puede otorgar iguales beneficios en otras variedades de peras, sin embargo para su uso consultar a nuestro Departamento Técnico. Aplicaciones por temporada: 1.
Manzanos	Gro 500™ uniforma la floración y brotación.	1,5	Época de aplicación: Esta puede variar dependiendo de las condiciones del tiempo y de la zona o región en donde se ubiquen los huertos. Se debe aplicar 30 a 35 días antes de la brotación de la variedad a tratar. Mojar hasta punto de escurrimiento, asegurando un buen cubrimiento.
Kiwi	Gro 500™ aumenta el porcentaje de brotación y uniformiza el crecimiento de los brotes.	3	Época de aplicación: Esta puede variar dependiendo de las condiciones del tiempo y de la zona o región en donde se ubiquen los huertos. Se debe aplicar 30 días antes de la fecha normal de brotación de la variedad a tratar. Mojar hasta punto de escurrimiento, asegurando un buen cubrimiento (alto volumen de agua). En otras situaciones se puede aplicar Gro 500™ en dosis de 5 L/100 L agua con nebulizadora usando menores volúmenes de agua (600 a 700 L/ha). Para esto, consultar a nuestro Departamento Técnico. Aplicaciones por temporada: 1.
Cerezos	Gro 500™ se puede aplicar en cerezos dulces para hacer coincidir los polinizantes o para complementar las horas de frío en las zonas menos frías (Santiago).	3	Época de aplicación: Aplicar 60 a 55 días antes de la fecha normal de inicio de floración. Se debe asegurar el cubrimiento adecuado de todas las yemas. Se puede causar algún grado de fitotoxicidad al tratar plantas con algún tipo de stress ó con un excesivo mojamiento. Aplicaciones por temporada: 1.
Ciruelos Nogales	Gro 500™ se puede aplicar para suplir las horas de frío en zonas cálidas y/o hacer coincidir la floración de los polinizantes en ciruelos y para concentrar floración en nogales.	2	Época de aplicación: Aplicar 45 días antes de la fecha normal de brotación para adelantar la floración y 30 días antes para concentrar la floración. Se debe asegurar el cubrimiento adecuado de todas las yemas. Aplicaciones por temporada: 1.
Arándanos	Gro 500™ suple las horas de frío en zonas cálidas, para mejorar la brotación y uniformar el crecimiento de los frutos y/o coincidir la floración de los polinizantes y asegurar la cuaja.	1,5	Época de aplicación: Aplicar 30 a 45 días antes de la fecha normal de brotación. Se debe asegurar el cubrimiento adecuado de todas las yemas. Aplicaciones por temporada: 1.
Frambuesas		3	

Preparación de la mezcla: Llenar el estanque del pulverizador con agua hasta la mitad, agregar la cantidad indicada de **Gro 500™**. Agitar la solución.
Incompatibilidad: No mezclar con otros productos fitosanitarios.

Compatibilidad: Para favorecer el cubrimiento de **Gro 500™** se recomienda aplicar en mezcla con el coadyuvante Break.

Fitotoxicidad: Evite la deriva de **Gro 500™** a cultivos vecinos, ya que es fitotóxico en tejidos verdes, especialmente en plantaciones de limones. No aplicar **Gro 500™** en huertos débiles o con algún tipo de stress, ya que podría ocasionar algún grado de fitotoxicidad. No aplicar **Gro 500™** a intervalos menores a 7 días de una aplicación de aceite.

Periodos de carencias: No aplicable, por el momento de aplicación.

Tiempo de reingreso: Para personas se recomienda una espera de 4 horas después de realizada la aplicación, sin embargo para realizar trabajos en las plantas tratadas, se recomienda el uso de guantes hasta 5 días después de la aplicación del producto. El tiempo de reingreso para animales no es aplicable, ya que el producto no está recomendado en cultivos destinados a pastoreo.

Nota: **Gro 500™** es degradado completamente en la planta y en el suelo por lo cual no deja residuos.

© Break es Marca Registrada de Goldschmidt

FRANJA AMARILLA



NOCIVO

