

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Usar solamente el producto que viene en envases originales

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Quinolinecarboxylic acid**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
  - En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
  - En caso de ingestión: provocar el vómito, no suministrar sustancias que favorezcan la absorción como grasas, leche, alcohol u otras, suministrar carbón medicinal.
  - En caso de inhalación: suministrar aire puro y desabrochar la ropa en el área del pecho; en caso de inconsciencia: realizar respiración artificial.

**TELEFONOS DE EMERGENCIA**

**SAMU: 106**  
**CISPROQUIM (línea gratuita): 0 800 50 847**  
**BASF Peruana S.A.: 513 2505**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
  - Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
  - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
  - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**
- Nocivo para organismos acuáticos.
  - No contaminar ríos, estuarios o arroyos con los desechos o envases vacíos.
  - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
  - En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



# Facet®SC

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### HERBICIDA AGRÍCOLA

#### SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

**COMPOSICIÓN:**

Quinclorac ..... 250 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

**Reg. N° 641-98-AG-SENASA**

**TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO**

**POR: BASF Peruana S.A.**

Av. O. R. Benavides 5915 - Callao Casilla

3911, Lima 100 Telf.: (01) 513 2500

Fax: (01) 513 2519

**FORMULADO POR: Schirm GmbH**

Mecklenburger Strasse 229 23568 Lübeck

Alemania

**PARA: BASF Societas Europaea**

67056 Ludwigshafen Alemania

**DISTRIBUIDO POR:**

**DROKASA PERÚ S.A.**

Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9

Magdalena del Mar, Lima - Perú

Telf.: (01) 501-1000



**CONTENIDO NETO: 1 L**

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

Marca Registrada BASF

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- Facet®SC es un herbicida sistémico de postemergencia selectivo, con efecto residual en el cultivo de arroz, indicado especialmente para el control de Echinochloa así como también de otras malezas de hojas anchas y gramíneas.
- Facet®SC Actúa como regulador de crecimiento de las malezas, modificando el metabolismo en forma similar al ácido indolacético o herbicidas auxínicos o compuestos del ácido benzotriólico y de la piridina. Quinclorac pertenece al **Grupo HRAC 4**.
- Facet®SC es absorbido por semillas en germinación, por las raíces y también por vía foliar.
- **Para asegurar la homogeneidad en el formulado, agítense antes de usar.**
- Llevar con agua (volumen/ha de acuerdo al equipo a usar) hasta un tercio del depósito, agregar la cantidad correspondiente de Facet®SC, completando luego la capacidad del recipiente con agua. Después de una ligera agitación se tiene una solución estable lista para ser aplicada.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVO	MALEZA		DOSIS L/ha	PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre Científico			
Arroz	Moco de pavo	<i>Echinochloa crus-galli</i>	1.0 – 1.2	77	5.0
	Cebadilla	<i>Echinochloa colona</i>	1.2 – 1.6		

PC: Período de Carencia LMR: Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:**

Aplicación postemergente temprana, con malezas de 1 a 2 hojas. Con Echinochloa de 3-4 hojas usar la dosis mayor. El terreno a aplicar debe estar con la humedad adecuada. Evitar que el viento acarree Facet®SC hacia cultivos sensibles como: Tomate, Algodón, Apio, Perejil, Zanahoria y Soja. El agua de riego tratada con Facet®SC, puede causar daños a cultivos susceptibles hasta 7 días después de su aplicación. No sembrar otros cultivos hasta 3 meses después de haber aplicado Facet®SC. Rotar o mezclar el uso con otros herbicidas de diferente modo de acción para evitar la aparición de biotipos de Echinochloa tolerantes o resistentes a Quinclorac. Efectuar las aplicaciones solo en los momentos especificados.

**PERIODO DE REINGRESO:**

Se recomienda no ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

Se debe evitar aplicar Facet®SC con productos de reacción alcalina, sin embargo se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

**FITOTOXICIDAD:**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

