

Inoculante para maní

Histick® 2 Maní

Líquido

Composición

Bacterias fijadoras de nitrógeno (*Bradyrhizobium sp. Arachis*). Este producto suministra 2×10^9 bacterias viables a la elaboración y no menos de 1×10^8 bacterias viables al vencimiento (equivalente a 80.000 bacterias viables por semilla de maní)

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTE RÓTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Inscripto en SENASA con el N° 21.353

BASF Argentina S.A. Tucumán 1 Tel.: 4317-9600 (C1049AAA) Buenos Aires
Representante en la República Argentina de BASF SE, 67056 Ludwigshafen - Alemania

CONTENIDO NETO

4,2 litros

ORIGEN
ARGENTINA

LOTE

Ver impreso en la vejiga

FECHA DE ELABORACIÓN

Ver impreso en la vejiga

FECHA DE VENCIMIENTO

9 meses de la fecha de elaboración

Características generales: Histick® 2 Maní es un inoculante líquido de superior calidad con una alta concentración de bacterias fijadoras de nitrógeno seleccionadas y controladas que suministran a las plantas el nitrógeno necesario para su desarrollo y óptima producción del cultivo de maní.

Dosis: 1,4 l/ha para siembras a 70 cm entre surcos o bien 28,6 ml/300 m de surco.

Almacenamiento: Histick® 2 Maní contiene microorganismos vivos en un medio estéril, por lo que es necesario evitar su exposición al sol y a temperaturas elevadas. Almacenar en envases originales en lugar fresco, seco y con temperaturas inferiores a 28°C.

Instrucciones de uso: limpiar el equipo: asegurar que la máquina para aplicar líquidos esté libre de residuos químicos antes de añadir el inoculante. Configurar la pulverizadora para la aplicación en surcos: seleccionar e instalar un disco regulador apropiado de flujo (orificio) de manera de obtener una corriente constante de líquido dentro del surco. Ajustar la posición y el flujo del líquido con el inoculante de forma que éste caiga directamente sobre la superficie de las semillas antes de cubrir el surco. La eficacia del producto puede estar limitada si el inoculante es aplicado arriba o a un lado de las semillas del surco. Agitar bien antes de usar: no abrir el paquete antes de su uso. Vaciar el contenido de paquete dentro del tanque de la pulverizadora. Ajustar el volumen del tanque pulverizador al nivel requerido usando agua limpia, fresca y libre de cloro. Asegurar que el inoculante sea mezclado por completo antes de su uso. Para evitar la sedimentación del producto, mantener el tanque pulverizador en agitación constante. El inoculante ya diluido debe usarse antes de las 24 horas. No permitir que la temperatura de la mezcla del tanque supere los 28 °C. El volumen de la aplicación debe ser de 50 - 100 lt por hectárea para pulverizadoras de bajo volumen y 100 - 200 lt por hectárea para pulverizadoras mayores. Para un ancho de surco de 70 cm, asegurar que el equipo esté calibrado para suministrar la dosis correcta de aplicación: 28,6 ml/300 m de surcos (equivalente a 1,4 l/ha).

Inoculante para maní

Histick® 2 Maní

Líquido

Composición

Bacterias fijadoras de nitrógeno (*Bradyrhizobium sp. Arachis*). Este producto suministra 2×10^9 bacterias viables a la elaboración y no menos de 1×10^8 bacterias viables al vencimiento (equivalente a 80.000 bacterias viables por semilla de maní)

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTE RÓTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Inscripto en SENASA con el N° 21.353

BASF Argentina S.A. Tucumán 1 Tel.: 4317-9600 (C1049AAA) Buenos Aires
Representante en la República Argentina de BASF SE, 67056 Ludwigshafen - Alemania

CONTENIDO NETO

4,2 litros

ORIGEN
ARGENTINA

LOTE

Ver impreso en la vejiga

FECHA DE ELABORACIÓN

Ver impreso en la vejiga

FECHA DE VENCIMIENTO

9 meses de la fecha de elaboración

Precauciones

- Almacenar en lugar fresco y a la sombra, con temperaturas inferiores a 28 °C.
- Los recipientes y utensilios que se utilicen para la preparación del producto, deben estar perfectamente limpios.
- Es aconsejable evitar la siembra en horarios de máxima intensidad solar. De no ser posible, recomendamos colocar bolsas de arpillera mojadas sobre la tapa de la tolva sembradora, para mitigar las altas temperaturas.
- Sembrar en suelos húmedos y en época adecuada, procurando una rápida germinación.
- Evitar el contacto directo de los fertilizantes con las semillas inoculadas.
- No mezclar con fungicidas líquidos o en polvo de uso habitual. Estos deben ser aplicados antes de la inoculación.
- Bajo condiciones adversas y en lotes sin antecedentes de cultivo, se recomienda doble dosis.

NOTA

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones de uso, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa o consecuencia del uso o almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad del producto dentro de la fecha de vencimiento.