

Suspensión concentrada SC
Fungicida
Uso agrícola
Reg. Nal. ICA 0339
Actualización: 09 de octubre de 2018


We create chemistry

F

Forum[®] 500 SC

Forum[®] 500 SC es un fungicida que actúa específicamente sobre oomicetos y ofrece una gran actividad protectante y antiesporulante en el control de mildew en el cultivo de rosas así como en enfermedades conocidas como del tizón, gota o cenicilla en varios cultivos como papa, tomate y cebolla.

Forum[®] 500 SC posee acción sistémica translaminar y protección prolongada. Su acción antiesporulante reduce significativamente el potencial de re-infección.

Forum[®] 500 SC actúa en el oomicete inhibiendo la formación y geminación de las esporas y su liberación, además de impedir la germinación del esporangio y la elongación del esporangióforo. Forum[®] 500 SC al interrumpir la formación de la pared celular elimina el patógeno, a diferencia de otros fungicidas que solo detienen el desarrollo de la enfermedad.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes activos:

Dimethomorph 500 g/L
(E,Z)-4-[3-(4-cloro-fenil)-3-(3,4-dimetoxifenil)-acrilolil]morfolina.

Ingredientes aditivos:

C.s.p 1 L

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Suspensión concentrada SC
Fungicida
Uso agrícola
Reg. Nal. ICA 0339
Actualización: 09 de octubre de 2018

BASF
We create chemistry

RECOMENDACIONES DE USO:

| CULTIVO | Enfermedad/Plaga | Dosis Producto Comercial. | PR* | PC** |
|----------------------|---|---------------------------|---|-------------------|
| Rosas | Mildeo veloso (<i>Peronospora sparsa</i>) | 0.6 a 0.8 cc/L | Cuando seque el producto sobre el follaje | No aplica |
| Papa y Tomate | Gota, Tizón o Lancha (<i>Phytophthora infestans</i>) | 0.6 a 0.8 L/Ha | 12 horas | 16 días 7 días |
| Cebolla | Mildeo - Cenicilla (<i>Peronospora destructor</i>) | 0.6 a 0.8 L/Ha | 12 horas | 7 días |

P.C.: Periodo de carencia.
P.R.: Periodo de reentrada.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Rosas: Aplique FORUM® 500 SC en dosis de 0.6 a 0.8 cc/Litro de manera preventiva o al observar los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones del ambiente sean favorables para su desarrollo, cada 4 a 5 días en tiempo lluvioso, cada 7 a 9 días en tiempo seco. Se recomienda FORUM® 500 SC en mezcla con fungicidas de contacto como metiram (2 g/Litro de agua), para obtener un mayor efecto preventivo sobre "Mildeo Velloso" en el cultivo de rosa.

Papa, tomate, cebolla: Aplique FORUM® 500 SC en dosis de 0.6 a 0.8 L/Ha. para el control de "gota" *Phytophthora infestans* y cenicilla *Peronospora destructor* en los cultivos de papa, tomate y cebolla. Se recomienda FORUM® 500 SC en mezcla con fungicidas de contacto como metiram (2.25 Kg/Ha) para obtener un mayor efecto preventivo sobre "gota y cenicilla" en cultivos de papa, tomate y cebolla, respectivamente.





MANEJO ANTIRRESISTENCIA:

Para reducir el riesgo de desarrollar resistencia al dimethomorph (DMM) en los hongos, se recomienda utilizar FORUM® 500 SC siempre en alternancia con fungicidas protectantes como metiram, mancozeb o clorothalonil en sus dosis comerciales en rotación con fungicidas de diferente mecanismo de acción.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Emplear equipo con agitador. Llenar el tanque con agua hasta la mitad. Diluir la cantidad necesaria de FORUM® 500 SC en 2 o 3 litros de agua (premezcla). Agregar esta mezcla en el tanque con el agitador funcionando y luego completar con agua, manteniendo la agitación hasta terminar con la aplicación.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Puede ser aplicado con equipo manual o terrestre. Calibre el equipo antes de aplicar el producto. Para la aplicación utilice boquillas de cono sólido o cono hueco. Lave el equipo después de cada jornada de trabajo.

COMPATIBILIDAD:

FORUM® 500 SC es compatible con la mayoría de los agroquímicos y fertilizantes de uso común, excepto con los de reacción fuertemente alcalina. Se recomienda realizar pruebas de fitocompatibilidad antes de mezclar con otros productos.

PRESENTACIÓN: 120 cc y 1.0 L.

PRECAUCIONES:

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y bien cerrado, en un lugar fresco y aireado, lejos de alimentos, drogas, forrajes, animales domésticos y nunca en el mismo lugar donde se duerme, come o preparan los alimentos.

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión.
- Evite contacto con la piel y la ropa.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.



En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela esta etiqueta.

Por ingestión: NO PROVOCAR el vómito. Lavar la boca y administrar.

Por inhalación: Retire al paciente a un lugar fresco, seco y aireado; manténgalo en reposo y vigile la respiración.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

No dar de beber nada, ni inducir el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.

En caso de intoxicación llamar a CISPROQUIM. Teléfonos 01 8000 916012 o (1) 2886012 en Bogotá D.C. Servicio las 24 horas. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimento o agua para consumo. Rotulado Aprobado ICA: 06/09/2007.



PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

No contamine fuentes de agua, ríos o acequias con el producto. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue el envase al programa Campo Limpio de manejo de envases