

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO****"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"****PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- **HEADLINE®PRO** es moderadamente irritante a la piel: evitar contacto con la piel y la ropa.
- **Es moderadamente irritante a los ojos: causa irritación moderada a los ojos.**
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación hacer uso de guantes, mascarilla, botas, careta de protección, gafas y ropa protectora.
- Utilice ropa protectora para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación.
- Durante la aplicación, como con todos los agroquímicos, evitar el contacto directo con el producto. Peligroso si es inhalado, evite respirar la aspersión.
- Después de la aplicación, lavarse bien, bañarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla.
- El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes.
- Consérvese el producto en envases originales, herméticamente cerrados.
- Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.
- Usar solamente el producto que viene en envases originales.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

Grupo Químico: Estrobilurinas

- En caso de inhalación: Mover a la persona a un área ventilada, dar respiración artificial si es necesario, llamar al médico.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua por 15-20 minutos. Llamar al médico.
- En caso de contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente con agua por 15-20 minutos. Consultar con el médico.
- En caso de ingestión accidental: Llamar al médico. Beber agua si la persona puede tragar.
- No provocar el vómito a menos que sea recomendado por el centro médico o el doctor. No administrar nada a una persona inconsciente.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA****SAMU: 106****CISPROQUIM (línea gratuita): 0 800 50 847****BASF Peruana S.A.: 513 2505****CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- Muy tóxico para los organismos acuáticos. con efectos nocivos duraderos
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de, al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# Headline® Pro

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRICOLA****FUNGICIDA AGRICOLA****CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)****COMPOSICION:**

Pyraclostrobin ..... 250.0 g/L

Aditivos .....c.s.p. 1.0 L

**Reg. PQUA N° 198 – SENASA****TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO****POR: BASF Peruana S. A.**

Av. O. R. Benavides 5915 - Callao Casilla

3911, Lima 100 Telf.: (01) 513 2500

Fax: (01) 513 2519

**FORMULADO POR: BASF S.A.**

Av. Brasil, 791 Bairro Eng. Neiva

Guaratinguetá SP - Brasil

**DISTRIBUIDO POR: CYTOPERU S.A.C.**

Av. Isaac Newton N° 138, Urb. Industrial

San Francisco Ate Lima - Perú

Telf.: (01) 326-5888

**CONTENIDO NETO: 1 L**

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

©= Marca Registrada BASF

**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO****INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**Headline®Pro** es un fungicida de acción preventiva y antiesporulante. Inhibe la germinación de las esporas, el desarrollo y la penetración de los tubos germinativos y proporciona una mayor actividad metabólica a la planta aumentando la actividad de la enzima nitrato-reductasa resultando una mejor sanidad en los cultivos. Actúa a nivel de los tejidos tratados, en las hojas se transloca de una cara a otra (translaminar) acumulándose en la cutícula. **Grupo FRAC 11.**

**Headline®Pro** se aplica en solución con agua. Llenar el tanque o cilindro hasta la mitad de su capacidad con agua, agregar la dosis recomendada, completar con agua y agitar hasta lograr una mezcla homogénea. Agitar la mezcla antes de llenar los equipos de aplicación.

Puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarias o accionadas por tractores. Los pulverizadores deben de estar en buen estado y ser calibrados antes de ser usados.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre Científico	L/Ha	mL/cil		
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	-	300	3	2.0
Cacao	Moniliasis	<i>Moniliophthora roreri</i>	0.5	-	n.d.	0.1
Café	Roya	<i>Hemileia vastatrix</i>	-	250 - 300	45	0.3
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	0.6	370	7	0.2
Espárrago	Tizón foliar	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.4 - 0.5	160 - 200	40	0.02
Mandarina	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	0.4 - 0.5	40 - 50	14	1.0
Mango	Colletotrichum	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	0.5	-	7	0.05
	Oidium	<i>Oidium mangiferae</i>				

\* PC = Período de Carenacia \*\* LMR = Límite Máximo de Residuos n.d. no determinado

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN** Aplicar el producto en programas de rotación de productos con diferentes mecanismos de acción.

- Alcachofa: Aplicar preventivamente o al inicio de la enfermedad, efectuar buena cobertura sobre el follaje.
- Cacao, realizar las aplicaciones en la floración, de manera preventiva o al inicio de la enfermedad.
- Café: Aplicar preventivamente o al inicio de la enfermedad, usar la dosis más alta bajo condiciones que favorecen alta presión de la enfermedad, puede ser aplicado en plena floración.
- Cebolla aplicar al inicio de la enfermedad, repetir cuando las condiciones climáticas sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.
- Espárrago: Aplicar preventivamente o al inicio de la enfermedad, usar la dosis menor bajo condiciones de baja presión y la dosis mayor en agroecosistemas de alta presión. Realizar una buena cobertura sobre el follaje con un gasto de agua no menor a 500 L de agua por ha.
- Mandarina: aplicar al inicio de la floración y repetir la aplicación en plena floración, realizar buena cobertura sobre toda la planta.
- Mango: Efectuar las aplicaciones en el período de fructificación, cuando los frutos estén en proceso de maduración - momento crítico para la presencia de Colletotrichum - realizar la última aplicación 30 días antes de la cosecha, es recomendable efectuar buena cobertura de aplicación sobre los frutos. Para oidiosis efectuar dos aplicaciones de manera preventiva, la primera al inicio de la floración y la segunda en el cuajado de frutos, empleando un volumen de agua no menor a 850 L/ha.

**Emplear 02 aplicaciones por campaña como máximo, considerando una campaña al año.**

**PERIODO DE REINGRESO:** Se recomienda no ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** **Headline®Pro** puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas, excepto los de reacción alcalina, sin embargo se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

**FITOTOXICIDAD:** La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

