

PRECAUCIONES

• **Storm Bloque Cebo 0,005%** pertenece al grupo químico cumarínico.
• Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco. • Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la manipulación del producto usar guantes de goma.
• Lavarse las manos después de la aplicación. • Avisar a los usuarios de las instalaciones que se está realizando el tratamiento. Finalizado el tratamiento, recoger los restos de cebo y eliminarlos de acuerdo con instrucciones de las autoridades competentes. Usar guantes al recoger y enterrar los roedores muertos. • No almacenar **Storm Bloque Cebo 0,005%** junto con alimentos ni materiales que, por su fuerte olor, puedan dañar las propiedades organolépticas o afectar su apetecibilidad.
• Este producto es muy tóxico para mamíferos y vida silvestre.
Los animales pueden envenenarse al ingerir el cebo o roedores muertos.

Síntomas de intoxicación: Mayor tendencia al sangrado, por ejemplo: la nariz, por las encías y presencia de hematomas, así como de sangre en la orina y excrementos. La aparición de los síntomas puede demorar desde algunas horas, hasta 5 ó 6 días. No es probable que ocurran envenenamientos, a menos que haya habido una ingestión accidental.

Primeros auxilios: Contacto con los ojos: enjuagarlos con agua corriente por 10 a 15 minutos manteniendo los párpados separados.
Contacto con la piel: lávela inmediatamente con agua y jabón. **Ingestión:** Provocar el vómito sólo si la persona está consciente. Llamar al médico.

Tratamiento médico: En caso de ingestión está indicado el lavado gástrico. Si se sospecha de envenenamiento, especialmente si se observan los síntomas, determinar el tiempo de protrombina no menos de 18 horas después de la ingestión. Si hay incremento, administrar vitamina K1 por vía oral. Puede ser necesario continuar diariamente durante varias semanas. El antídoto debe discontinuarse con cuidado, observando el tiempo de protrombina constantemente durante 4 días o más, después de interrumpir su administración.

Antídoto: Vitamina K1 (Fitomenadiona oral)
Riesgos ambientales: En condiciones normales de uso **Storm Bloque Cebo 0,005%** no presenta peligro para aves, peces y abejas. Flocumafen es muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

ADVERTENCIAS

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.
INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS
NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA
FLOCUMAFEN PUEDE DAÑAR EL FETO.
FLOCUMAFEN PROVOCA DANOS EN LOS ÓRGANOS (SANGRE) TRAS EXPOSICIONES PROLONGADAS O REPETIDAS

Teléfonos de emergencia:
BASF Chile S.A.: (562) 22 640 7000
CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (562) 22 635 3800
(ATENCIÓN LAS 24 HORAS)
CITUC QUÍMICO (Emergencia química): (562) 22 247 3600

Nota al Comprador:
Mediante ensayos cuidadosos, se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.



We create chemistry

Storm Bloques

Raticida Bloque Cebo 0,005%
Raticida en Bloque cebo 0,005% listo para su uso, de dosis única para el control de ratas y ratones. **Storm Bloque Cebo 0,005%**, contiene colorante hidrosoluble azul y amargante Benzoato de denatonio como medidas de seguridad que previenen la ingesta humana accidental.

Composición:
Cada 100 g contiene:
*Flocumafen 95% 0,005 g
Benzoato de denatonio (N°CAS 3434-45-9).....0,001 g
Ingredientes inertes..... 99,995 g
* 4-hidroxí-3-[1,2,3,4-tetrahidro-3-[(4-(4-trifluorometilbenzilo)fenil)-1-naftil]cumarina (mezcla de isómeros cis y trans) (N°CAS 90035-08-8)

Registro ISP: P-158/20

VENTA GENERAL

Grupo Químico: cumarínico

10 Kilos

Contenido neto: **10 Kilos**
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

Producto no inflamable, no corrosivo, no explosivo

Fabricado por: BASF S.E. Inglaterra

Importado y Distribuido por: **BASF Chile S.A.**
Carrascal 3851 Casilla 3238. Quinta Normal. Santiago.
Teléfono: 22 640 7000
Fax: 22 640 7373
Representante en Chile de **BASF SE**

No. de Lote:
Fecha de Fabricación:
Fecha de Vencimiento:



RECOMENDACIONES DE USO GENERALIDADES

Storm Bloque Cebo 0,005% es un raticida que reúne todas las características necesarias para obtener un efectivo control de ratas y ratones. Además es seguro en el uso.

Storm Bloque Cebo 0,005% tiene acción anticoagulante al ser ingerido por las ratas y/o ratones.

- Storm Bloque Cebo 0,005%** otorga un efectivo control, porque:
- Formulación altamente palatable, resistente a la humedad ya que contiene cera.
 - Su forma única, permite que los ratones se lleven el producto a la madriguera y lo compartan con el resto de la colonia.
 - Dosis única
 - Mata a los roedores en pocos días sin provocar rechazo al cebo.
 - Contiene un colorante azul hidrosoluble que tiñe las fecas de los roedores, lo cual permite verificar el consumo del cebo.
 - Uso en exteriores e interiores.

Storm Bloque Cebo 0,005% es seguro en el uso:

- Contiene un colorante hidrosoluble azul que tiñe la boca de azul, permitiendo detectar su ingesta accidental. En caso de ingestión accidental de otras especies, la presencia del colorante en las fecas permitirá emplear el antídoto oportunamente.
- Además contiene Benzoato de denatonio, amargante que previene la ingestión humana accidental, no afectando la aceptabilidad del cebo por los roedores.

INSTRUCCIONES DE USO

Storm Bloque Cebo 0,005% viene listo para usar, no requiere ser pesado.

PROBLEMA	DOSIS	OBSERVACIONES (*)
Ratas	3 a 5 bloques cada 5 mts en infestaciones graves y cada 10 mts en infestaciones leves.	Las bocas de las madrigueras, las sendas de las ratas y las pilas de basuras son puntos adecuados para la colocación de los cebos. Examinar los puntos de cebo cada 7 días, reemplazando los que hayan sido consumidos y reubicar aquellos que se encuentren intactos.
Ratón o laucha	1 a 2 bloques cada 2 - 5 mts en lugares donde se observa la presencia de ratones.	En viviendas colocar 1 a 2 Bloques en sitios inaccesibles tales como debajo del piso, en cavidades del techo, a lo largo de tubos o conductos, detrás de zócalos, muebles y artefactos. Examinar los puntos de cebo cada 7 días, reemplazando los que hayan sido consumidos y reubicar aquellos que se encuentren intactos.

(*) En caso de usar **Storm Bloque Cebo 0,005%** en exteriores, se recomienda cubrir o colocar los bloques dentro de un tubo (porta cebos) para evitar que sean consumidos por otros animales. Para su uso en alcantarillados, poner los bloques en una distancia adecuada del agua para facilitar su consumo.

(ISP FEB'2024)



CLASE III
LIGERAMENTE
PELIGROSO



18114268926

D.A.C. JUL 2024 - 3