

## FICHA TÉCNICA

### ADEXAR® EC

Fungicida Agrícola  
Concentrado Emulsionable EC

#### COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:  
Fluxapiroxad.....62.5 g/L  
3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluorobiphenyl-2yl)pyrazole-4  
carboxamide, formulación a 20°C

Epoxiconazole: .....62.5 g/L  
(2*RS*,3*SR*)-1-[3-(2-chlorophenyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluorophenyl)propyl]-1*H*-1,2,4  
Triazole formulación a 20°C

**Ingredientes Aditivos:** csp 1L

**Registro Nacional ICA No.1679**  
**Titular de registro: BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.**

#### IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

BASF Química Colombiana S.A.  
Apartado Aéreo 5751  
Teléfono: (1) 6322260  
Bogotá D.C.

---

Banda Azul  
CATEGORIA TOXICOLOGICA II – Moderadamente peligroso  
DAÑINO

---

NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO  
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMESTICOS  
PELIGROSO SI ES INHALADO. EVITE RESPIRAR POLVO, VAPOR O ASPERSIÓN.  
CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS.  
EL CONTACTO PROLONGADO O REPETIDO PUEDE CAUSAR REACCIONES ALERGICAS EN CIERTAS PERSONAS

### **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Mantenga el producto en su empaque original, con la etiqueta en buen estado, bien tapado, en lugar fresco y aireado, lejos de alimentos, drogas y forrajés,
- No fume, coma o beba mientras manipula el producto.
- Use gafas, respirador y guantes de caucho para manejar el producto concentrado.
- No permanezca en la nube de aspersion.
- Al terminar, cámbiese de ropa y báñese con abundante agua y jabón.

No contamine fuentes de agua, ríos o acequias con el producto

- Se sospecha que daña al feto

### **INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de ingestión, **NO** provoque el vómito y lleve la persona inmediatamente y muéstrele esta ficha técnica
- Si se salpica los ojos, manteniéndolos abiertos, lávelos con abundante agua limpia durante 10 a 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón

**En caso de intoxicación llamar a CISPROQUIM. Teléfonos 01 8000 916012 ó (1) 2886012 en Bogotá D.C. Servicio las 24 horas.**

### **MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:**

- Extremadamente toxico para organismos acuáticos. No contamine fuentes de agua, ríos o acequias con el producto. Respetar las franjas de seguridad con relación a cuerpos de agua.

### **ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO**

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su empaque original.

### **INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

#### **CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO**

**ADEXAR® EC** es un fungicida de acción preventiva y curativa compuesto por dos ingredientes activos: **Fluxapyroxad** y **Epoconazole** con amplio espectro de control.

**Fluxapyroxad** inhibe la enzima succinato deshidrogenasa (SDH), la cual desempeña un papel fundamental en la respiración del hongo en el complejo II de la mitocondria e interrumpe el suministro de componentes básicos moleculares para el crecimiento de la célula. **Epoconazole** es un triazol que inhibe la biosíntesis de ergosterol en la membrana.

**ADEXAR® EC** combina dos modos de acción diferentes y complementarios: Sistémico translaminar y Mesostémico. **ADEXAR® EC** inhibe la germinación de esporas y el crecimiento de micelio en el desarrollo del hongo.

**ADEXAR® EC** tiene un nuevo mecanismo de acción y no tiene resistencia cruzada con otros fungicidas

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS Producto Comercial.	P.C	P.R.
Arroz	<p><b>Añublo de la vaina</b> <i>Rhizoctonia solani</i></p> <p><b>Añublo del arroz</b> <i>Pyricularia oryzae</i></p> <p><b>Pudrición de la vaina</b> <i>Sarocladium oryzae</i></p> <p><b>Mancha naranja</b> <i>Gaeumannomyces graminis</i></p> <p><b>Escaldado de la hoja</b> <i>Rhynchosporium oryzae</i></p>	1 L/ha	20 días	6 horas

P.C.: Período de carencia  
P.R.: Período de reentrada

### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Aplique **ADEXAR® EC** de manera preventiva o cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad entre los 40 y 50 días después de la emergencia del cultivo.

**ADEXAR® EC** es totalmente selectivo al cultivo del arroz en las dosis recomendadas.

### COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Antes de efectuar mezclas se recomienda realizar previamente pruebas de compatibilidad y fitotoxicidad con el producto que se desea aplicar.

**ADEXAR® EC** se puede mezclar con coadyuvantes siliconados en las dosis y frecuencias recomendadas por el fabricante.