

FICHA TÉCNICA **ARRECIFE®**

Paecilomyces lilacinus y *Bacillus firmus*
Nematicida Biológico / Polvo Humectable

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

% EN PESO

INGREDIENTES ACTIVOS:

Paecilomyces lilacinus (Equivalente a 34g/Kg, con un contenido de 3.0×10^9 UFC/g)3.4
Bacillus firmus (Equivalente a 26 g/Kg, con un contenido de 5.0×10^8 UFC/g)2.6

INGREDIENTES INERTES:

Encapsulante, soporte, surfactante, protectantes y espesante94.0
Total 100.00 %

Reg: RSCO-MEZC-NEMA-0910-X0001-02-006

DISTRIBUIDO POR:

BASF MEXICANA S.A. DE C.V.
AV. INSURGENTES SUR 975,
COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES,
C.P. 03710, CIUDAD DE MÉXICO.
TEL: 01 (55) 5325-2600

“INSTRUCCIONES DE USO”

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS L / ha	OBSERVACIONES
Berenjena Chile Chile Bell Jitomate Papa Tabaco Tomate de cáscara (SL)	Nematodo agallador (<i>Meloidogyne incognita</i>)	3.0-5.0	Realizar 3 aplicaciones en drench, a la base de la planta, a intervalos de 20 y 10 días. Iniciar las aplicaciones 10 días después del transplante. Volumen de aplicación 50 mL de la mezcla/planta
Pepino Melón Calabaza Calabacita Chilacayote (SL)		4.0-5.0	Realizar 3 aplicaciones, a intervalos de 20 días, entre la primera y segunda; y 15 días entre la segunda y tercera aplicación, dirigidas a la base de la planta, en drench.

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
Tiempo de reentrada a los lugares tratados: Una vez seque el producto

METODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Rompa la esquina superior izquierda con unas tijeras (nunca con la boca), procurando no entrar en contacto directo con el producto. En el equipo de aplicación llenar el tanque hasta $\frac{3}{4}$ de su capacidad, posteriormente agregue **ARRECIFE®** y termine de llenar con agua. Sea plica en drench con suficiente agua. Mantener en constante agitación. Aplíquelo inmediatamente después de preparar la mezcla.

CONTRAINDICACIONES

Aplicar **ARRECIFE®** en condiciones climáticas favorables, no en horas de máxima insolación. No aplicar si se pronostica lluvias dentro de las 4 horas después de la aplicación. No aplicar con velocidad de viento superior a los 10 km/hora. Preferentemente realizar la aplicación en las mañanas o por las tardes.

ARRECIFE® no es fototóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

No se recomienda mezclar **ARRECIFE®** con otros plaguicidas.

MANEJO DE RESISTENCIA

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

INFORMACIÓN ADICIONAL: custodia@basf.com