

FICHA TECNICA **Alverde® 240 SC**

metaflumizona

Insecticida / Suspensión Concentrada

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

Ingrediente activo:	% EN PESO
Metaflumizona: (EZ)-2'-[2-(4-cianofenil)-1-(α,α,α -trifluoro-m-tolil)etilideno]-4-(trifluorometoxi)carbanilohidrazida. (Equivalente a 240 g de i.a./L a 20°C)	22.00 %
INGREDIENTES INERTES.	
Dispersante, humectante, anticongelante, antiespumante y vehículo.	78.00 %
TOTAL	100.00 %

Reg: RSCO-INAC-0103Y-301-064-022

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR:

BASF MEXICANA S.A. DE C.V.

AV. INSURGENTES SUR 975,

COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES,

C.P. 03710, CIUDAD DE MÉXICO.

TEL: 01 (55) 5325-2600

INSTRUCCIONES DE USO

Alverde® 240 SC es un insecticida que actúa por contacto e ingestión con ligera acción translaminar.

Alverde® 240 SC se recomienda para el control de las siguientes plagas.

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS	OBSERVACIONES
TOMATE (3) (jitomate) CHILE BELL (3)	Gusano falso medidor <i>Trichoplusia ni</i> Gusano del fruto <i>Helicoverpa zea</i>	0.8-1.2 L / ha	Las aplicaciones deben de realizarse de acuerdo con el umbral económico de la plaga. No deben hacerse más de 2 aplicaciones secuenciales de Alverde® 240 SC con un intervalo de 4 a 7 días.
Cultivos bajo condiciones de agricultura protegida			
TOMATE (3) (jitomate) CHILE BELL (3)	Gusano soldado <i>Spodoptera exigua</i>	2 - 3 mL / L de agua	Las aplicaciones deben de realizarse de acuerdo con el umbral económico de la plaga. Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días.

() = **Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y cosecha.

Tiempo de reentrada a los lugares tratados: 12 horas después de la aplicación.

Método para preparar y aplicar el producto:

Preparación: Agregue agua limpia al tanque del equipo de aplicación aproximadamente a la mitad de su capacidad, posteriormente agregue la cantidad necesaria de **Alverde® 240 SC** y llene el tanque a su capacidad manteniendo una agitación constante, la mezcla lista para aplicarse no debe de dejarse de un día para otro.

Equipo de aplicación: Para equipo terrestre, usar de 200 a 600 L de agua/ha, con el cual debe lograrse una buena cobertura de aspersión.

Contraindicaciones:

No aplicar cuando existan temperaturas altas (más de 28°C), se recomienda hacer las aplicaciones durante la mañana o la tarde. **Alverde® 240 SC** no es fitotóxico en los cultivos y en las dosis aquí recomendadas.

Incompatibilidad:

Alverde® 240 SC es compatible física y químicamente con otros plaguicidas; si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta; sin embargo, es necesario realizar una prueba de incompatibilidad previa aplicación.

“Manejo de Resistencia”.

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

INFORMACIÓN ADICIONAL: custodia@basf.com