

FICHA TECNICA

Akorde®

Bacillus amyloliquefaciens

Fungicida biológico / Polvo humectable

“COMPOSICION PORCENTUAL”

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (Equivalente a 40g de i.a./Kg, con una concentración de 2.0×10^9 UFC/g)	4 %
INGREDIENTES INERTES: Encapsulante, soporte, surfactante, protectantes y espesante	96 %
Total	100.00 %

Reg. RSCO-FUNG-0190-0615-002-4.0

TITULAR DEL REGISTRO Y FORMULADOR:

QUÍMICA AGRONÓMICA DE MÉXICO, S DE R. L. DE C.V.

Calle 18 20501 COLONIA IMPULSO

C.P. 31183 CHIHUAHUA, CHIH. MÉXICO

TEL. (614) 483-9000

DISTRIBUIDO POR:

BASF MEXICANA S.A. DE C.V.

AV. INSURGENTES SUR 975,

COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES,

C.P. 03710, CIUDAD DE MÉXICO.

TEL: 01 (55) 5325-2600

“INSTRUCCIONES DE USO”

Akorde® es un fungicida biológico formulado a base de *Bacillus amyloliquefaciens*, el cual combate el desarrollo del hongo fitopatógeno “*Alternaria porri*” que se presenta en el área foliar de las plantas. Esto lo logra a través de diversos mecanismos tales como; competencia de nutrientes, exclusión del sitio, liberación de componentes celulares durante el crecimiento (antibiosis), en orden de eliminar ó reducir los competidores en su medio ambiente inmediato.

Cultivo	Intervalo de seguridad	plaga	Dosis Kg/ha	Observaciones
AJO CEBOLLA CEBOLLÍN PORO	SIN LÍMITE	Mancha púrpura (<i>Alternaria porri</i>)	1.0- 3.0	Realizar 2 aplicaciones al follaje, a intervalos de 7 días: volumen de aplicación 230-330 L de agua / ha.

Tiempo de reentrada a la zona tratada: Una vez que seque el producto.

() Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL = Sin Límite

Métodos para preparar y aplicar el producto

Rompa la esquina superior izquierda con unas tijeras (nunca con la boca), procurando no entrar en contacto directo con el producto. En el equipo de aplicación llenar el tanque hasta $\frac{3}{4}$ de su capacidad, posteriormente agregue **Akorde**[®] y termine de llenar con agua. Se aplica por aspersión con suficiente cantidad de agua para lograr un buen cubrimiento del follaje. Mantener en constante agitación. Aplíquelo inmediatamente después de preparar la mezcla.

Contraindicaciones

Aplicar **Akorde**[®] en condiciones climáticas favorables, no en horas de máxima insolación. No aplicar si se pronósticas lluvias dentro de las 4 horas después de la aplicación. No aplicar con velocidad de viento superior a los 10 km/hora. Preferentemente realizar la aplicación en las mañanas o por las tardes.

Incompatibilidad

No se recomienda mezclar **Akorde**[®] con otros plaguicidas.

INFORMACIÓN ADICIONAL: custodia@basf.com