

**FICHA TECNICA**  
**Dormex®**  
Regulador de crecimiento

REGULADOR DE CRECIMIENTO (COMPENSACIÓN DE HORAS FRÍO) / LÍQUIDO

**“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”**

% EN PESO

**INGREDIENTE ACTIVO:**

**Cianamida Hidrogenada Estabilizada**.....49%

REG: RSCO-0025/II/95

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR:

**BASF MEXICANA S.A. DE C.V.**  
AV. INSURGENTES SUR 975,  
COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES,  
C.P. 03710, CIUDAD DE MÉXICO.  
TEL: 01 (55) 5325-2600

**“INSTRUCCIONES DE USO”**

**Dormex®** es un antidormante que influye en la fase de la dormancia de cultivos caducifolios. **Dormex®** aplicado sobre las ramas, adelanta la brotación floral y foliar y también así, la fecha de la cosecha. **Dormex®** uniformiza la floración, aumenta el número de frutas, facilita y mejora la eficiencia de las labores de cultivo y los controles fitosanitarios.

**Dormex®** produce una brotación completa de las yemas sobre la madera y ramas tratadas, y aumenta los rendimientos.

los rendimientos.

<b>CULTIVO</b>	<b>DOSIS Y MOMENTO DE APLICACIÓN</b>	
Vid	4%	Aplicar inmediatamente después de la poda.
Uva de mesa	5%	Hacer las aplicaciones cuando no se tenga viento, ya que cultivos vecinos pueden ser afectados. Con excepción del uso en durazno, para una mejor adherencia y completo mojado agregar un coadyuvante no iónico del grupo de los organosiliconados. Regar normalmente después de la aplicación.
Manzano	1,5-4%	
Nogal pecanero	4%	
Nogal de castilla	3-5%	
Durazno	1-1,5%	
Ciruelo	1-1,5%	
	Por 100 L de agua	Por cilindro 200L
	1-5 L (1-5%)	2-10 L (1-5%)
<b>Tolerancia de residuos:</b> el producto se degrada totalmente.		

**Tiempo de re-entrada:** Una vez este totalmente seco el producto.

**Métodos para preparar y aplicar el producto:**



We create chemistry

Agregue agua limpia al tanque hasta la mitad, agregar la cantidad de **Dormex®** y un adherente. Agitar el caldo y llenar el tanque. El pH del agua debe encontrarse entre 6 y 7.

**Dormex®** sólo debe aplicarse con tractor.

Con excepción del uso en durazno se agrega un adherente a el volumen de aplicación depende del tamaño y de la densidad cultivo. Se debe asegurar una buena cobertura y mojar hasta el punto escurrimiento.

La aplicación se realiza con equipo motorizado usando una aspersion dirigida. La época de aplicación depende del objetivo, adelantar o uniformizar la brotación de las yemas, en lugares con heladas tardías se aplica 20-30 días antes de la fecha de la brotación normal.

**Dormex®** aplicado bajo temperaturas bajas extremas puede variar su desempeño.

Se recomienda aplicar **Dormex®** solo o con adherente.

**INFORMACIÓN ADICIONAL:** [custodia@basf.com](mailto:custodia@basf.com)