



We create chemistry

FICHA TECNICA **Stroby® DF**

kresoxim-metil

FUNGICIDA / GRANULOS DISPERSABLES

COMPOSICION PORCENTUAL		% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO: Kresoxim-Metil: Metil (E)-metoxi-imino [α -(o-toliloxi)-o-tolil] acetato (Equivalente a 500 g de i.a./Kg)	NO MENOS DE:	50.00 %
INGREDIENTES INERTES:	NO MAS DE:	50.00 %
	TOTAL:	100.00 %

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR:

BASF MEXICANA, S.A. DE C.V.

AV. INSURGENTES SUR 975

COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES

C.P. 03710,

CIUDAD DE MÉXICO

TEL. 01 (55) 5325-2600

FAX. 01 (55) 5611-5557

INSTRUCCIONES DE USO

Stroby® DF es un producto con presentación de gránulos dispersables que contiene como ingrediente activo al Kresoxim-metil perteneciente al grupo de estrobilurinas de actividad fungicida. **Stroby® DF** tiene un efecto protectante ya que inhibe la germinación de esporas del hongo y es curativo-erradicativo porque inhibe el crecimiento del micelio y la esporulación en la superficie de la hoja. Puede aplicarlo en situaciones de pre y post infección; sin embargo, el control óptimo de la enfermedad es logrado cuando **Stroby® DF** es aplicado en forma preventiva, se recomienda la rotación de aplicaciones con otros funguicidas.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS DE PRODUCTO (g/100 L de agua)	OBSERVACIONES
MANZANO (30)	CENICILLA DEL MANZANO <i>Podosphaera leucotricha</i>	20 a 30	Iniciar las aplicaciones cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad con la dosis baja en intervalos de 10 a 14 días entre cada aplicación, y mientras las condiciones para el desarrollo de la enfermedad sean más propicias aplicar la dosis alta con intervalos de 7 a 10 días.
PERAL (30)	CENICILLA <i>Podosphaera leucotricha</i>	20 a 30	Iniciar las aplicaciones cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad con la dosis baja en intervalos de 10 a 14 días entre cada aplicación, y mientras las condiciones para el desarrollo de la enfermedad sean más propicias aplicar la dosis alta con intervalos de 7 a 10 días.



We create chemistry

ROSAL (Sin límite)	CENICILLA DEL ROSAL <i>Sphaerotheca pannosa</i>	250 – 350 g / ha	Iniciar las aplicaciones con la dosis más baja cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad y realizar una segunda aplicación a los 7 días para controlar la esporulación de la cenicilla.
VID (14)	MILDIU <i>Plasmopara viticola</i> CENICILLA POLVORIENTA <i>Uncinula necator</i>	20 - 30	Iniciar las aplicaciones cuando se presenten las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad. Se recomienda hacer las aplicaciones a intervalos de 7 - 10 días.
Calabaza Calabacita Melón Pepino <i>Sandía</i> (3)	CENICILLA <i>Erysiphe cichoracearum</i>	200 g / ha	Iniciar las aplicaciones cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad y de ser necesario, continuar con las aplicaciones a intervalos de 7 días para controlar la esporulación de la cenicilla.
Tomate Berenjena Chile Chile Bell Jitomate (14)	TIZÓN TEMPRANO <i>Alternaria solani</i>	150 – 200 g / ha	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación 500 – 650 L de agua / ha.

Tiempo de reentrada: 12 horas después de la aplicación.

() = Intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha.

METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Aplique las dosis de **Stroby® DF** indicadas en la etiqueta con equipo terrestre con un gasto de agua de 400 L de agua aprox. El equipo debe ser revisado y calibrado frecuentemente.

Iniciar las aplicaciones cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad. Se debe tener cuidado de diluir en suficiente cantidad de agua para asegurar una buena cobertura del follaje.

CONTRAINDICACIONES:

Las aplicaciones deben realizarse por la mañana o por la tarde. No aplicar cuando haya amenaza de lluvia o cuando la velocidad del viento sea mayor a 15 km/h. **Stroby® DF** no es fitotóxico a las dosis y en los cultivos aquí indicados.

INCOMPATIBILIDAD:

Stroby® DF no debe mezclarse con productos de fuerte reacción alcalina. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad previas a cualquier mezcla, y debe mezclarse con productos autorizados y registrados para los cultivos aquí indicados.

MANEJO DE RESISTENCIA:

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

Con el objetivo de mantener la efectividad de **Stroby® DF**, BASF Mexicana, S.A. de C.V. sugiere apegarse a las siguientes estrategias:

Stroby® DF puede utilizarse en no más de 2 aplicaciones secuenciales y de inmediato alternar con otro fungicida que pertenezca a un grupo químico diferente a las Estrobilurinas y con diferente modo de acción, efectuando un mínimo de aplicaciones y posteriormente se podrá aplicar **Stroby® DF** otras 2 veces seguidas como máximo. No aplicar más de 4 veces **Stroby® DF** por ciclo.

INFORMACIÓN ADICIONAL: custodia@basf.com



We create chemistry