

FICHA TÉCNICA **ATECTRA®**

Dicamba
Herbicida / Concentrado Soluble

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

| | % EN PESO |
|---|-----------|
| INGREDIENTE ACTIVO: | |
| Dicamba: Sal de diglicolamina del ácido 3,6-dicloro-o-anísico | 58.1 |
| (Con un contenido del ácido 3,6 dicloro-o-anísico al 39,4% equivalente a 480 g de i.a./L 20°C) | |
| INGREDIENTES INERTES: | |
| Diluyente y colorante..... | 41.9 |
| Total | 100.00 % |

REGISTRO SANITARIO: RSCO-HEDE-0215-X0044-375-58.1

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR:

BASF MEXICANA S.A. DE C.V.
AV. INSURGENTES SUR 975,
COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES,
C.P. 03710, CIUDAD DE MÉXICO.
TEL: 01 (55) 5325-2600

“INSTRUCCIONES DE USO”

Atectra® es un herbicida selectivo y post-emergente soluble en agua que se recomienda para usarse en maíz y sorgo. El ingrediente activo de **Atectra®**, actúa al contacto con la maleza y es absorbido por hojas, tallo y raíces translocándose dentro de la planta y provocando su muerte dentro de los siete días siguientes a la aplicación:

| CULTIVO | MALEZA | | DOSIS mL / ha | OBSERVACIONES |
|---------|--------------|-------------------|------------------|---------------|
| | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | | |

| | | | | |
|---|--|---|---------|---|
| Maíz (37) Sorgo (37) | Amargosa Quintonil Verdolaga Campanita Aceitilla Gigantón | <i>Ambrosia artemisiifolia</i> <i>Amaranthus hybridus</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Ipomoea purpurea</i> <i>Bidens odorata</i> <i>Tithonia tubiformis</i> | 300-500 | <p>Momento de aplicación al cultivo: Realizar una aplicación en post-emergencia con un máximo de 6 hojas verdaderas.</p> <p>Momento de aplicación a la maleza: Realizar una aplicación post-emergente</p> <p>Volumen de aplicación: Realizar la aplicación, con un volumen de agua de 450-550 L/ha.</p> |
| Arroz (16) Avena (16) Cebada (16) Centeno (16) Trigo (16) | Malva Chual de castilla Chual blanco | <i>Malva parviflora</i> <i>Chenopodium sp.</i> <i>Chenopodium álbum</i> L. | 300-500 | Realizar una aplicación foliar en post-emergencia al cultivo, volumen de aplicación 150-250 L/ha. |

() **Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
 Tiempo de reentrada a los lugares tratados: Una vez secado el producto

METODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

El envase del producto debe abrirse girando la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj, retire con cuidado el sello de seguridad y vierta el producto hacia el interior del tanque de aplicación. Utilice el equipo de protección indicado en la parte izquierda de la etiqueta. Calibre su equipo de aplicación para determinar el gasto de agua por hectárea a utilizar. Utilice boquillas de abanico plano para la aplicación. Se debe mantener una agitación constante durante la aplicación.

Preparación del caldo de aspersion. Agregue agua al tanque de mezclado hasta las ¾ partes de su capacidad, luego agregue la cantidad necesaria de **Atectra®** y llene el tanque a su capacidad mantenimiento una agitación constante.

CONTRAINDICACIONES

Los intervalos de cosecha aquí señalados son para condiciones locales; para fines de exportación, el usuario debe considerar las tolerancias e intervalos establecidos en el país destino. Las aplicaciones deben realizarse de preferencia por la mañana o por la tarde. No aplicar en temperaturas mayores de 28°C ó cuando la velocidad del viento sea mayor a 15 km/h.

No se aplique **Atectra®** sobre o cerca de cultivos no recomendados en la etiqueta que pudieran plantas que no sean las malezas y el cultivo seleccionado.

Atectra® usado en los cultivos aquí señalados y a las dosis aquí recomendadas no es fitotóxico.

INCOMPATIBILIDAD

No se recomienda **Atectra®** en mezclas de tanque. Si desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta; sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVÍTE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Transporte este producto en su envase original, perfectamente cerrado y claramente etiquetado, y almacene en un lugar seguro, fresco, seco y ventilado. Nunca transportar o almacenar junto con alimentos, ropa o forrajes.

INFORMACIÓN ADICIONAL: custodia@basf.com