



We create chemistry

PLAGUICIDA DE USO PROFESIONAL PARA EMPRESAS  
CONTROLADORAS DE PLAGAS

# Fendona® 6 SC

ALFACIPERMETRINA

INSECTICIDA - PIRETROIDE  
SUSPENSIÓN CONCENTRADA

Composición química:

(S) - $\alpha$ -cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R) -3 (2,2-dichlorovinyl) - 2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate y (R)- $\alpha$ -cyano-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3 (w,w-dichlorovinyl) -2,2 dimethylcyclopropanecarboxylate ..... 6.0 %  
Ingredientes inertes ..... 94.0 %  
Total ..... 100.00%  
Contiene 10 gramos de ingrediente activo por litro de producto formulado.

p/v

## PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

**PRECAUCIÓN, LEA LA ETIQUETA, EL PANFLETO Y LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.**

**EN CASO DE MALESTAR O INTOXICACIÓN, LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA.**

**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE MANIPULARLO Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**

### MODO DE ACCIÓN:

Alfacipermetrina: Su acción es a nivel sistema nervioso central, generando una alteración de la transmisión del impulso nervioso. Su efecto fundamental de debe a una modificación en el canal del sodio de la membrana nerviosa. Despolarizan el potencial de las membranas de los axones, esto reduce la amplitud del potencial de acción y lleva a la pérdida de excitabilidad eléctrica. Estos efectos ocurren porque los piretroides prolongan la corriente que fluye por los canales de sodio al hacer más lento o al impedir el cierre de los canales.

### INSTRUCCIONES DE USO

#### EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:

Respirador para vapores orgánicos, guantes resistentes a productos químicos, lentes con cubiertas laterales, usar pantalla facial si existe riesgo de pulverización, camisa de manga larga y pantalón largo.

**USO RECOMENDADO. ES UN INSECTICIDA DE CONTACTO Y ACCIÓN RESIDUAL PARA EL CONTROL DE INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES EN ÁREAS EXTERNAS.**

**PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:** Para la preparación de la mezcla, llene el tanque hasta la mitad y agregue la cantidad necesaria de Fendona® 6 SC, agitando bien para que se haga una mezcla correcta, luego completar con agua y volver a agitar. Regule el pH de la mezcla a 5. Prepare únicamente la mezcla que pueda ser aplicada durante el mismo día.



### DOSIS Y PLAGAS:

PLAGA	DOSIS	
	GRADO DE INFESTACIÓN	
	Regular	Alto
<b>Hormigas</b> ( <i>Formica rufa</i> , <i>Solenopsis spp.</i> , <i>Monomorium minimum</i> ), <b>Moscas</b> ( <i>Musca domestica</i> ), <b>Chinchas</b> ( <i>Cimex lectularius</i> ), <b>Ciempiés</b> ( <i>Lithobius spp.</i> ), <b>Cucarachas</b> ( <i>Blattella germanica</i> , <i>Periplaneta americana</i> ), <b>Grillos</b> ( <i>Acheta domestica</i> ), <b>Tijerillas</b> ( <i>Forficula auricularia</i> ), <b>Escarabajos</b> ( <i>Callosoma argentinense</i> ), <b>Avispas</b> ( <i>Vespa vulgaris</i> ), <b>Pulgas</b> ( <i>Ctenocephalides felis</i> , <i>Pulex irritans</i> ), <b>Milpiés</b> ( <i>Archispirostreptus gigas</i> ), <b>Mosquitos</b> ( <i>Aedes aegypti</i> , <i>Culex quinquefasciatus</i> ), <b>Pescaditos de plata</b> ( <i>Lepisma saccharina</i> ), <b>Abejas</b> ( <i>Apis mellifera</i> ), <b>Arañas</b> ( <i>Pholcus phalangioides</i> ), <b>Alacranes</b> ( <i>Centruroides spp.</i> ), <b>Garrapatas</b> ( <i>Rhinocentrus sanguineus</i> , <i>Ixodes ricinus</i> ).	1 litro en 200 litros de agua o 100 ml en 20 litros de agua	2 litros en 200 litros de agua o 200 ml en 20 litros de agua
<b>INSTRUCCIONES DE USO:</b> Para aplicaciones interiores en general, aplique suficiente caldo y a baja presión en las áreas donde las plagas se escondan y dar atención a grietas y rendijas. Para uso externo en general, aplique con bomba manual o motorizada para evitar la infestación de interiores, para lo cual hacer un tratamiento perimetral, aplicando una banda en el suelo y/o vegetación de 2 a 3 metros de ancho alrededor. Aplique uniformemente usando 4 litros de mezcla por cada 100 m <sup>2</sup>		

### USO RECOMENDADO GUATEMALA, NICARAGUA Y COSTA RICA. PLANTAS ORNAMENTALES - JARDINES

PLAGA	DOSIS	
	GRADO DE INFESTACIÓN	
	Regular	Alto
<b>Hormigas</b> ( <i>Formica rufa</i> , <i>Solenopsis spp.</i> , <i>Monomorium minimum</i> ), <b>Afidos</b> ( <i>Aphis spp.</i> , <i>Aulacorthum spp.</i> , <i>Brachycaudus spp.</i> , <i>Capitophorus spp.</i> , <i>Coloredoa spp.</i> , <i>Myzus spp.</i> ), <b>Trips</b> ( <i>Heliothrips spp.</i> , <i>Frankliniella spp.</i> , <i>Haplothrips spp.</i> ), <b>Lepidopteros</b> ( <i>Ectopis crepuscularia</i> , <i>Epirrita autumnata</i> , <i>Eupithecia pusillata</i> ), <b>Minadores</b> ( <i>Liriomyza spp.</i> , <i>Kallithea lycopersicella</i> , <i>Phyllocnistis citrella</i> , <i>Lithocolletis ringoniella</i> , <i>Phyllocnistis bicarcellata</i> ), <b>Abejones</b> ( <i>Phyllocyba spp.</i> ), <b>Masticadores</b> ( <i>Locusta migratoria</i> , <i>Schistocerca gregaria</i> , <i>Dociostaurus maroccanus</i> , <i>Tettigonia viridissima</i> , <i>Pulex irritans</i> , <i>Diabrotica spp.</i> , <i>Spodoptera exigua</i> , <i>Heliothis spp.</i> ), <b>Mosca blanca</b> ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Aleurotrixus flocosus</i> , <i>Bemisia argentifolii</i> ), <b>Acaros</b> ( <i>Dermatophagoides farinae</i> ).	1 litro en 200 litros de agua o 100 ml en 20 litros de agua	2 litros en 200 litros de agua o 200 ml en 20 litros de agua

PLAGA	DOSIS	
	GRADO DE INFESTACIÓN	
	Regular	Alto
<b>Gorgojos de los cereales</b> ( <i>Sitophilus granarius</i> ) <b>Gorgojo de la ropa</b> ( <i>Attagenus</i> ) <b>Gorgojo de la harina</b> ( <i>Tribolium castaneum</i> ) <b>Gusano de la harina</b> ( <i>Tenebrio monitor</i> ) <b>Palomilla de la semilla</b> ( <i>Pyralis farinalis</i> ) <b>Piojo de la harina</b> ( <i>Psycosidos</i> )	1 litro en 200 litros de agua o 100 ml en 20 litros de agua	2 litros en 200 litros de agua o 200 ml en 20 litros de agua

NOTA: Con un 1 litro de caldo alcanza para tratar 20 m<sup>2</sup>.

**PERIODO DE REINGRESO A ÁREAS TRATADAS:** Una vez que haya secado el producto aplicado. **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:** No es inflamable, ni explosivo, ni corrosivo.

**FRASES Y ADVERTENCIAS DE USO: NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ROPA. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. NUNCA REUTILICE ESTE EMPAQUE. NO COMER, BEBER O FUMAR CUANDO SE UTILICE ESTE PRODUCTO. LAVARSE CUIDADOSAMENTE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN DESPUES DE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO.**



### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Utilice equipo de protección personal durante el manejo y uso de este producto.

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Si se ingiere puede causar debilidad, temblores en manos y pies y convulsiones. La exposición dérmica durante la preparación de las mezclas formuladas resulta en sensaciones transitorias en la piel, en los sitios de contacto.

### PRIMEROS AUXILIOS:

**POR INGESTIÓN:** Si la persona afectada está en condiciones de deglutir, permítale tomar lentamente sorbos de agua. Provocar el vómito, sólo por indicación del Centro de Toxicología o del médico.

**NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO EN UNA PERSONA INCONSCIENTE. POR INHALACIÓN:** Llevar a la persona afectada al aire libre y dejarla reposar en calma. Dar respiración artificial si es necesario.

**CONTACTO OCULAR:** En caso de llevar lentes de contacto, retirarlos transcurridos los primeros 5 minutos y continuar con el proceso de lavado.

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA DURANTE VARIOS MINUTOS. SI LA IRRITACIÓN OCULAR PERSISTE VISITAR A UN MÉDICO.**

**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL QUITAR INMEDIATAMENTE TODA LA ROPA CONTAMINADA. LAVAR LAS ZONAS DE PIEL EN CONTACTO CON EL PLAGUICIDA, USANDO AGUA Y JABÓN ABUNDANTES.**

**RECOMENDACIONES AL MÉDICO:** Tratar sintomáticamente (descontaminación y vigilar funciones vitales). **NO TIENE ANTÍDOTO.**

**EN CASO DE MALESTAR O INTOXICACIÓN, LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y ENTREGUE ESTE PANFLETO.**

INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONO
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA	GUATEMALA	225-13560
HOSPITAL NACIONAL ROSALES	EL SALVADOR	22319262
HOSPITAL ESCUELA	HONDURAS	2232-2322
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA	NICARAGUA	2897150
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES	COSTA RICA	2223-1028

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:** No es inflamable, ni explosivo, ni corrosivo.

### MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL:

**TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS. TÓXICO PARA ABEJAS. NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**

Aproveche el contenido completo del envase. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. En Costa Rica, disponer como un residuo de manejo especial. Los remanentes de plaguicidas sin utilizar deben mantenerse en su envase original debidamente cerrado y etiquetado.



### INDICACIONES ESPECIALES PARA ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DEL ENVASE:

No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga los insecticidas en contacto con otros agroquímicos, fertilizantes, semillas. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Conserve el producto en su empaque original, etiquetado, con su panfleto y cerrado herméticamente.

Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

**FORMULADO EN:** BASF AGRI-PRODUCTION SAS. Z.I Lyon Nord, Rue Jacquard, 69727. Genay, Francia. Teléfono: +33(0)4-72-08-11-11

**AVISO DE GARANTÍA:** Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según las instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por causa o consecuencia del uso inadecuado o almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento.

**PAÍS NÚMERO DE REGISTRO**

**COSTA RICA 4116-P-140**

**NUMERO DE LOTE: VER ETIQUETA O VER ENVASE.  
FECHA DE FORMULACIÓN: VER ETIQUETA O VER ENVASE.  
FECHA DE CADUCIDAD: VER ETIQUETA O VER ENVASE.**

© Marca Registrada de BASF.