

Presentación: Polvo

Recomendaciones:

- Mantener a temperatura ambiente;
- El pulverizador debe estar limpio y libre de cualquier residuo químico que pueda afectar los microorganismos.

Modo de usar:

- Disuelva 1 frasco de LactoSilo Gold Liofilizado en 100 litros de agua potable sin cloro ni residuos químicos; o disuelva dos y media medidas de la tapa del frasco de LactoSilo Gold para cada 20 litros de agua (pulverizador). Se recomienda hacer esta dilución 24 horas antes del uso.
- Utilice agua a temperatura ambiente.
- Pulverice 2 litros por tonelada de ensilado.

Composición Básica:

Lactobacillus curvatus, *Lactobacillus acidophilus*,
Lactobacillus plantarum, *Lactobacillus buchneri*,
Pediococcus acidilactici, *Enterococcus faecium*,
Lactococcus lactis (Sorgo S1) y *Celulosa* (Enzima 4%).



LactoSilo® Gold

Liofilizado

7 Lactobacilos vivos
+ Enzimas

Para 50 T de ensilado
Acción Probiótica

CONTENIDO: 20 FRASCOS
CON 100g / FRASCO



Niveles de Garantía:

<i>Lactobacillus curvatus</i> (Min)	10 ¹⁰ UFC/g
<i>Lactobacillus acidophilus</i> (Min)	10 ¹⁰ UFC/g
<i>Lactobacillus plantarum</i> (Min)	10 ¹⁰ UFC/g
<i>Lactobacillus buchneri</i> (Min)	10 ¹⁰ UFC/g
<i>Pediococcus acidilactici</i> (Min)	10 ¹⁰ UFC/g
<i>Enterococcus faecium</i> (Min)	10 ¹⁰ UFC/g
<i>Lactococcus lactis</i> (Sorgo S1) (Min)	10 ¹⁰ UFC/g
<i>Celulosa</i> (Enzima Celulolítica 4%) (Min)	85 u/g

Indicado para ensilados de:

Maíz, Sorgo, Alfalfa, Soja, Pasturas, Granos Húmedos, Forrajes en general.

Importador y Distribuidores:

Argentina: BASF Argentina S.A. - Tucumán 1, C1049AAA, Buenos Aires. Producto para uso exclusivo en alimentación animal. **Chile:** Resolución SAG N° XXXXXX con fecha XXXXXX, BASF Chile S.A., Carrascal, 3851 Quinta Normal, Santiago. Aditivo alimenticio, no constituye alimento completo. **México:** BASF Mexicana S.A. Av. Insurgentes Sur 975, Col. Ciudad de los Deportes, Del. Benito Juárez México, DF 03710, México. **Costa Rica:** BASF de Costa Rica, S.A. Edificio Los Balcones, Sección A, primer piso, San José, Apartado Postal 10229-1000, Costa Rica. **Colombia:** BASF Química Colombiana S.A., localizada na Calle 99a. No. 51-32, Apartado Aéreo 5751, Bogotá, Colombia. Aditivo para utilizar en los ensilajes con el fin de acelerar la fermentación láctica de los silos.. **Paraguay:** BASF Paraguaya S.A. - Estados 415, Piso 5, Asunción. **Uruguay:** BASF Uruguay S.A. World Trade Center. Torre A - Of. 801- CP.11300 Luis Alberto de Herrera 1248. Montevideo, Importador y Distribuidor: Lage y Cia. S.A. Camino Carrasco 6948, Montevideo, Uruguay. **Ecuador:** BASF Ecuatoriana S.A., Avenida Naciones Unidas No. 1014 y Av. Amazonas, Edificio La Previsora Torre A Piso 2, Quito, Ecuador.

Fabricado por:

SLO Agropecuária Ltda - Rod. Celso Garcia Cid,
km 84 - Cx. Postal 226 - Cambé - PR - Origen: Brasil
www.sloagropecuária.com.br

Responsable Técnico: Wellington Garcia
Zootecnista - Inscrito en el Consejo Regional de Medicina Veterinaria del
Estado de Paraná (CRMV) - PR: 0251Z

No inflamable:

Lote:
Fecha de Elaboración:
**Validez 15 meses desde
la fecha de elaboración.**