

Hoja Técnica

Fecha Actualizada: 13/07/2022

Naria[®] Top Fungicida

TIPO	Fungicida
INGREDIENTE ACTIVO	Dimetomorph + Pyraclostrobin
GRUPO QUÍMICO	Ácido cinámico + Estrobirulina
CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN	Gránulos dispersables en agua (WG) que contiene 120 g de Dimetomorph + 67 g de Pyraclostrobin por kilogramo de producto comercial.
MECANISMO DE ACCIÓN	Dimetomorph tiene una elevada acción sistémica, ingresa rápidamente en el mesófilo de la hoja y tiene movimiento apoplástico. Pyraclostrobin tiene acción translaminar; a los pocos minutos una parte del producto ingresa rápidamente en el mesófilo y la otra parte forma depósitos en la capa cerosa de la hoja, las cuales se activan en presencia de agua. Efecto curativo, preventivo y antiesporulante.
MODO DE ACCIÓN	Dimetomorph es un derivado del ácido cinámico que impide la biosíntesis de la pared celular del patógeno por lo que actúa en diversas etapas del ciclo del hongo. Pyraclostrobin es una estrobirulina de última generación y de amplio espectro de control que actúa en el Complejo III de la cadena respiratoria en la mitocondria, bloqueando el paso de electrones e inhibiendo la formación de ATP.
TOXICIDAD	Categoría Toxicológica III. Ligeramente peligroso. DL50 Oral: > 300 - < 2000 mg/kg (rata) DL50 Dermal: > 5000 mg/kg (rata)
PRECAUCIONES	Puede ocasionar daño a los ojos. Durante la preparación y utilización del producto NO COMER, BEBER O FUMAR. EVITAR: la inhalación e ingestión de la sustancia nebulizada, así como el contacto del producto con la boca, los ojos y la piel. USAR: traje protector adecuado, gafas, mascarilla, guantes y botas.
PRIMEROS AUXILIOS	En caso de INGESTIÓN del producto: lavar inmediatamente la boca, dar de beber abundante agua y acudir al médico o a un Centro de Salud. En caso de INHALACION: apartar al accidentado de la zona de peligro, mantenerlo en calma y reposo, suministrarle aire fresco y buscar ayuda médica.

En caso de CONTAMINACIÓN de los ojos, lavarlos con abundante agua corriente durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si entra en contacto con la piel, bañarse con abundante agua y jabón. Despojarse de la ropa contaminada. Consultar con un médico y mostrarle la etiqueta.

ANTIDOTO	No se conoce antídoto específico.
REGISTRO	196- F1 / NA - CL1
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA	Aplicar el producto cubriendo totalmente el rosal. Para preparar la mezcla: agitar fuertemente el envase y verter la cantidad necesaria de Naria® Top, directamente al tanque conteniendo agua hasta sus ¾ partes. Llenar el depósito con agua y agitar el líquido hasta formar una mezcla homogénea.
COMPATIBILIDAD	Naria® Top es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común, a excepción de aquellos con reacción fuertemente alcalina.
FITOTOXICIDAD	Naria® Top no es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es usado de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.
PERÍODO DE CARENCIA	NO APLICA
REINGRESO AL ÁREA TRATADA	12 horas después de la aplicación
PRESENTACIÓN	1.0 kilo

® Marca Registrada de BASF. Leer la etiqueta antes de usar este producto.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS



Fungicida de acción sistémica translaminar con efectos curativos, preventivos y antiesporulantes.

Cultivo	RECOMENDACIONES DE USO		
	Problema	Dosis	Frecuencia de aplicación
Rosa (<i>Rosa sp.</i>)	Velloso (<i>Peronospora sparsa</i>)	1.75 kg/ha	Aplicar ante la aparición de los primeros síntomas y repetir cada 12 a 15 días.
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Lancha taría (<i>Phytophthora infestans</i>)	1.75 kg/ha	Aplicar ante la aparición de los primeros síntomas y repetir cada 12 a 15 días.