

Hoja Técnica

Fecha Actualizada: 02/03/2020

Swing® Pro

Fungicida

TIPO	Fungicida
INGREDIENTE ACTIVO	Epoxiconazol
GRUPO QUÍMICO	Triazoles
CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN	Suspensión concentrada que contiene 125 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.
MODO DE ACCIÓN	Epoxiconazol bloquea en los hongos la formación de ergosterol, que es un componente imprescindible de la pared celular.
TOXICIDAD	Categoría Toxicológica III. Ligeramente peligroso. DL50 Oral: > 2200 mg/kg (rata) DL50 Dermal: > 4000 mg/kg (rata) CI50 Inhalatoria: > 3.25 mg/l 4h
PRECAUCIONES	<p>El producto puede ser MORTAL si se ingiere. VENENOSO si se inhala. Puede ocasionar daño a los ojos. Durante la preparación y utilización del producto NO COMER, BEBER O FUMAR. EVITAR: la inhalación e ingestión de la sustancia nebulizada, así como el contacto del producto con la boca, los ojos y la piel. USAR: traje protector adecuado, gafas, mascarilla, guantes y botas. En caso de contaminación, lavarse las manos y las partes expuestas de la piel. DESPUES DEL USO: lavar el equipo utilizado y antes de COMER, BEBER O FUMAR, lavarse las manos y las partes expuestas de la piel.</p> <p>Conservar el producto en un lugar fresco con buena ventilación, en su envase original etiquetado y cerrado herméticamente, lejos de las bebidas y los alimentos para las personas y los animales. No emplear este envase para ningún otro fin, eliminarlo de manera segura. Antes de destruir el envase enjuagarlo con agua (cuarta parte del contenido) por lo menos tres veces y verter los residuos en el equipo de aplicación.</p>
PRIMEROS AUXILIOS	<p>En caso de INGESTIÓN del producto: lavar inmediatamente la boca, dar de beber abundante agua y acudir al médico, no inducir al vómito, ni suministrar nada por la boca cuando el paciente esté inconsciente o padece convulsiones.</p> <p>En caso de INHALACION: apartar al accidentado de la zona de peligro, mantenerlo en calma y reposo, suministrarle aire fresco y buscar ayuda médica.</p> <p>En caso de CONTAMINACIÓN de los ojos, lavarlos con abundante agua corriente durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si entra en contacto con la piel, bañarse con abundante agua y jabón.</p>

Oficinas Quito:
Av. Naciones Unidas E230 e Iñaquito.
Edificio Metropolitan, Piso 8
Teléfono: 593 2 397 9500

Oficinas Guayaquil:
Cda. Kenedy Norte, Av. Dr. Miguera H. Alcivar
Edificio Torres del Norte, Torre A, Piso 2, of. 208
Teléfono: 593 4 268 7170

ANTIDOTO	No se conoce antídoto específico.
REGISTRO AGROCALIDAD	96-F5/NA-CL1
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA	<p>Mezcla de swing Pro en emulsión Aceite-Agua.</p> <ol style="list-style-type: none"> Colocar la dosis recomendada de aceite en el tanque de mezcla (Actualmente se emplea entre 5- 8 L/ha) y adicionar la dosis recomendada de emulsificante (1% en relación al aceite). Agitar por 2 minutos. Adicionar el 70% de Agua y agitar por 2 minutos. Colocar la dosis recomendada de SWING PRO (0.8 L/ha). Agitar la mezcla por 2 minutos. Completar el 30% restante de agua necesaria para ajustar el volumen final entre 18 y 23 L/ha y agitar por 2 minutos.
COMPATIBILIDAD	Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad cuando se lo use en mezclas con otros plaguicidas en aceite agrícola.
FITOTOXICIDAD	SWING PRO no es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es usado de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.
PERÍODO DE CARENIA	0 días para banano
REINGRESO AL ÁREA TRATADA	12 horas después de la aplicación.
PRESENTACIÓN	5.0 – 60.0 – 200.0 litros

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS



Fungicida con acción sistémica y de contacto, eficaz para combatir la enfermedad Sigatoka del banano.

RECOMENDACIONES DE USO			
Cultivo	Plaga	Dosis	Frecuencia de aplicación
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	<i>Sigatoka Negra</i> (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	0.8 L/ha	Según la época y presión de la enfermedad, se puede aplicar a intervalos de 12 a 15 días, aplicando 3 ciclos por año. Considerar recomendaciones FRAC.

® Marca Registrada de BASF. Leer la etiqueta antes de usar este producto.

Oficinas Quito:
Av. Naciones Unidas E230 e Iñaquito.
Edificio Metropolitan, Piso 8
Teléfono: 593 2 397 9500

Oficinas Guayaquil:
Cdl. Kenedy Norte, Av. Dr. Miguera H. Alcivar
Edificio Torres del Norte, Torre A, Piso 2, of. 208
Teléfono: 593 4 268 7170