

Voraxor®

Herbicida

BASF

We create chemistry



LA MEJOR DEFENSA ES EL ATAQUE

Voraxor® es el nuevo herbicida pre-siembra BASF. Tu Jugador clave contra las malezas de hoja ancha y el atacante más veloz para lograr el control antes de la siembra. Un refuerzo de persistencia comprobada en toda la cancha.

Voraxor®

Herbicida



Es un innovador herbicida para soja, maíz, trigo, cebada y maní, para controlar malezas difíciles de hoja ancha. Voraxor® actúa en pre-emergencia y post-emergencia de las malezas, **brindando la desecación y la persistencia** que el cultivo requiere.

CARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN

Tirexor® (Trifludimoxazin 125 g/L)
Kixor® (Saflufenacil 250 g/L)

GRUPO QUÍMICO

Triazinona
Pirimidinadiona

CLASIFICACIÓN SEGÚN MODO DE ACCIÓN

14 (HRAC)

CULTIVOS

Uso previo a la siembra de soja, maíz, trigo, cebada y maní.

MODOS DE ACCIÓN

Inhibidor de la enzima protoporfirinógeno oxidasa (PPO)

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Gran velocidad de control

Persistencia comprobada

Selectividad

Excelente adaptabilidad de uso

Muy versátil

BENEFICIOS PARA EL PRODUCTOR

Alta eficacia en la desecación de malezas de hoja ancha


Retrasa la necesidad de aplicaciones post-emergentes

Aplicable hasta el día cero de la siembra

Compatible con otros herbicidas del mercado

Amplio espectro de cultivos (Soja, Maíz, Trigo y Cebada y Maíz); tanto en el segmento de pre-siembra y como en el de barbecho corto, sin restricciones rotacionales, con resultados estables y decisivos en diferentes ambientes

PRINCIPALES MALEZAS QUE CONTROLA



Voraxor®

Herbicida

RECOMENDACIONES DE USO

DOSIS


150 a 200 cc/ha, según diagnóstico
+DASH® HC 0,5 lts/ha
+Dash® MSO Max 0,25 lts/ha
+Glifosato

MOMENTO DE APLICACIÓN

Tamaño óptimo de las malezas de hoja ancha
< 10 cm de altura
< 5 cm de diámetro en roseta o 2-4 hojas

- **Amaranthus** hasta 3 cms de altura
- **Cobertura verde** de la maleza no debe superar el 30%

RESULTADOS EN AMARANTHUS SPP CON VORAXOR®



Cordoba, Argentina.

Voraxor®

Herbicida



¿POR QUÉ Voraxor® ES TU MEJOR DEFENSA?


- 1** Presenta nuevo **ingrediente activo**, con mejor desempeño en malezas resistentes a PPO
- 2** Abarca **amplitud de cultivos**: soja, maíz, trigo, cebada y maní.
- 3** Resuelve la **emergencia** de nuevas malezas y **retrasa** la necesidad de aplicaciones después de la emergencia del cultivo.

Voraxor® RECOMENDACIONES DE USO.

Voraxor®

150 a 200 cc/ha, según diagnóstico
+DASH® HC 0,5 lts/ha
+Dash® MSO Max 0,25 lts/ha
+Glifosato

Presiembra



Momento de aplicación

En pre-siembra hasta un día antes de la siembra.

Cultivo

Soja, Maíz, Trigo, Cebada y Maní.

Voraxor®

Herbicida

Voraxor® **CONTROLA LAS PRINCIPALES MALEZAS DE HOJA ANCHA**

CULTIVO	MALEZAS QUE CONTROLA		DOSIS CC/HA	MOMENTO DE APLICACIÓN
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO		
Barbecho (previo a soja, maíz, trigo, cebada o maní)	Nabón	Raphanus sativus	150 – 200 cc/ha	<p>En presiembra del cultivo. Para desecación de la maleza y supresión de nuevos nacimientos. Se recomienda que al momento de aplicación, la maleza no exceda los 10 cms de altura o 5 cms de diámetro y esté en activo crecimiento sin sufrir estrés. La cobertura verde de la maleza no debe superar el 30%. Agregar 0,5 lt/ha de Dash HC. Para el caso específico de enmalezamientos con <i>Amaranthus</i> sp, se recomienda que la maleza no exceda los 3-5 cms de altura.</p> <p>NO APLICAR SOBRE LOS CULTIVOS DE SOJA, MAIZ, TRIGO O CEBADA, EN POST-SIEMBRA o UNA VEZ QUE HAYA EMERGIDO EL CULTIVO.</p>
	Nabo	Brassica rapa		
	Afata	Sida rhombifolia L.		
	Altamisa	Ambrosia tenuifolia		
	Campanilla	Ipomea purpurea		
	Cardo ruso	Salsola kali		
	Cardo torito	Acicarpa tribuloides		
	Cerraja	Sonchus oleraceus		
	Corregüela	Convolvulus arvensis		
	Flor de Santa Lucía (*)	Commelina erecta		
	Malva	Malva parviflora		
	Malva Cimarrona	Amoda critata		
	Quinoa blanca	Chenopodium album		
	Rama negra	Conyza bonaerensis		
	Saetilla	Biden pilosa		
	Senecio amarillo	Senecio madagascariensis		
	Sunchillo	Wedelia glauca		
	Trébol de olor blanco	Melolotus albus		
	Tutia	Solanum sisymbriifolium		
	Verdolaga	Portulaca olearacea		
	Viola silvestre	Viola arvensis		
	Yaguá pety hú / Assa peixe roxo	Vernonia westiniana		
	Yerba del sapo	Tricardia brasiliensis		
Yuyo colorado	Amaranthus quitensis			
Yuyo colorado	Amaranthus hybridus			
Tuyo colorado	Amaranthus palmieri			

Voraxor®


Herbicida



 **BASF**

We create chemistry

 basf.com.ar

 0800-555-2273

 [basfagro_ar](https://www.instagram.com/basfagro_ar)

 [BASF.AgroAr](https://www.facebook.com/BASF.AgroAr)

 [BASF_Agro_ARG](https://twitter.com/BASF_Agro_ARG)

 [@BASF_Agro_AR](https://www.youtube.com/@BASF_Agro_AR)