BASF
We create chemistry

I

Efficon®

Dimpropirydaz
Insecticida / Concentrado soluble

"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

INGREDIENTE ACTIVO:	**% EN PESO**
Dimpropirydaz: 1-[(1RS)-1,2-dimetilpropil]-N-etil-5-metil-N-piridazin-4-il-1H-pirazol-4-carboxamida	10.79%
(Equivalente a 120 g de i.a. / L a 20°C)	

INGREDIENTES INERTES:	
Solventes, anticongelante, emulsificantes, agente antiespumante, buffer.	89.21%
Total	100.00%

Registro sanitario: RSCO-INAC-0629-X0851-375-10.79

Recuerde seguir las recomendaciones que vienen en la etiqueta del producto, así como el uso de equipo de protección personal completo, limpio y en buen estado durante el manejo y la aplicación de los productos

PRESENTACIONES DISPONIBLES:

PRESENTACIONES
1 L, 5 L

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: El propósito de este documento tiene un carácter únicamente informativo, por lo cual no sustituye ningún etiquetado o Registro Sanitario autorizados. Así mismo, esta información se presenta con la finalidad de proporcionar recomendaciones que podrá seguir para un uso y manejo correcto del producto en cuestión, sin embargo, usted entiende que el uso y manejo que pueda dar al producto es su responsabilidad y deberá ser realizado conforme al etiquetado.

En caso de requerir mayores detalles sobre esta solución o cualquier otra de nuestras soluciones para la protección de sus cultivos, consulte la etiqueta autorizada y/o acceda a la información proporcionada en nuestra página: www.agriculture.basf.com/mx/es.

Efficon®
Insecticida
Uso agrícola
Actualización: 9 de febrero de 2026

BASF
We create chemistry

"USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS, PLAGAS y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADOS"
"INSTRUCCIONES DE USO"
"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

CULTIVO	NOMBRE COMÚN	DOSIS L/ha	OBSERVACIONES
Berenjena, Chile, Jitomate (tomate rojo), Okra, Pimiento morrón, Tomate verde (0)	**Pulgón** *Aphis gossypii* **Trips** *Frankliniella occidentalis* **Mosquita Blanca** *Bemisia tabaci* **Psílido de la papa** *Bactericera cockerelli*	1.0	Realizar dos aplicaciones en drench a intervalos de 14 días, cuando se detecte la presencia de la plaga; volumen de aplicación sugerido 40 mL / planta.
Papa (0)	**Pulgón saltador** *Bactericera cockerelli*	1.0	Realizar una aplicación al fondo del surco al momento de la siembra; volumen de aplicación sugerido 300-500 L de agua/ha.
Calabaza, Calabacita, Chayote, Melón, Pepino, Sandía (0)	**Pulgón del algodón** *Aphis gossypii* **Mosquita blanca** *Bemisia tabaci*	1.0	Realizar dos aplicaciones en drench a intervalos de 14 días, cuando se detecte la presencia de la plaga; volumen de aplicación sugerido 40 mL / planta.

Número máximo de aplicaciones por ciclo: En los cultivos de Cucurbitáceas y Solanáceas no se debe realizar más de 3 aplicaciones en drench por ciclo/año.
( ) Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
Tiempo de reentrada a las áreas de siembra: Inmediatamente

Método para preparar y aplicar el producto.
El envase del producto debe abrirse girando la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj, retire con cuidado el sello de seguridad y vierta el producto hacia el interior del tanque de aplicación. Utilice el equipo de protección indicado en la parte izquierda de la etiqueta.

Contraindicaciones:
No aplicar cuando existan fuertes corrientes de aire (más de 15 km/h), ni cuando exista temperatura alta (más de 28°C). Este producto no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si se usa de acuerdo con las recomendaciones de uso. Los intervalos de cosecha aquí señalados son para condiciones locales; para fines de exportación, el usuario debe considerar los intervalos de cosecha y tolerancias establecidos en el país destino.

BASF
We create chemistry



Incompatibilidad.
No se ha demostrado la incompatibilidad de **Efficon®** con otros productos. En el caso de que se hagan mezclas, éstas deberán de hacerse únicamente con productos registrados y autorizados en los cultivos indicados en esta etiqueta. Se recomienda realizar una prueba previa de incompatibilidad a la aplicación.

Manejo de Resistencia.
“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.”

Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde prepare la mezcla para aplicación.

INFORMACIÓN ADICIONAL: custodia@basf.com